



USO VETERINARIO



CATÁLOGO VETERINARIO 2026





CUVITA ANIMAL HEALTH

Agradecemos a nuestros aliados comerciales, médicos veterinarios, técnicos zootecnistas, al hombre y mujer del campo; personas que con su compromiso y dedicación trabajan diariamente para construir un mejor país.

Entendemos los retos a los que diariamente se enfrentan y las metas que se desean lograr: **Prevención, mayor productividad, sostenibilidad y desarrollo en la crianza.**

Es por esto por lo que, durante 25 exitosos años de sólido crecimiento en el mercado pecuario, hemos venido desarrollando **productos farmacéuticos de primera calidad, eficientes y de alto rendimiento**; los cuales ponemos a su disposición en el presente catálogo.

Además, hemos ampliado nuestra influencia a nivel internacional, extendiéndose a mercados en **Ecuador, Bolivia, Honduras, Republica Dominicana, Nicaragua y Guatemala**. Este enfoque regional refleja nuestro compromiso con el crecimiento y la excelencia en el servicio a nuestros clientes.

¡Estamos convencidos que el trabajo fuerte y la tenacidad, de la mano con productos de alta calidad y servicios son la clave de todo **ÉXITO!**

¡CUVITA ANIMAL HEALTH,
fórmulas exitosas para el criador **EXITOSO!**

Walter Cubas

CEO AT CUVITA ANIMAL HEALTH

CONTENIDO

GUIA

Pg. 2 **GUIA PRACTICA**, Vacuno, Ovino, Alpacas
Pg. 3 **GUIA PRACTICA**, Porcino, Aves, Cuyes, Equinos

INYECTABLES

Pg. 4 **TILOBIOT FORTE**, Antibiótico antiinflamatorio y antihistamínico
Pg. 4 **TILOBIOT-G**, Antibiótico de amplio espectro
Pg. 4 **BRONCOVET**, Antibiótico, mucolítico, expectorante y antihistamínico
Pg. 5 **ENRO CU 10%**, Antibiótico flouroquinoleico
Pg. 5 **ENRO CU L.A. 20** Antibiótico flouroquinoleico de larga acción
Pg. 5 **OXIPLUS K**, Antibiótico y antiinflamatorio
Pg. 6 **SULFATEK**, Quimioterápico bactericida
Pg. 6 **HIERRO MAX 12**, Reconstituyente mineral vitaminado
Pg. 6 **H-DEXTRAN PLUS**, Suplemento reconstituyente, mineral vitaminado
Pg. 7 **VITAD3E**, Asociación vitaminica
Pg. 7 **CALCIO Mdg**, Calcificante, mineralizante y estimulante
Pg. 7 **NUTRICAL Coloidal**, Calcificante, vitaminado y mineralizado
Pg. 8 **VIGORMAX ATP**, Energizante, Estimulante metabólico
Pg. 8 **FOSFOSIN 34.1**, Reconstituyente mineral
Pg. 8 **CUVITA B INYECTABLE**, Suplemento multivitaminico
Pg. 9 **IVERMEXIN L.A.**, Antiparasitario interno y externo de larga acción
Pg. 9 **IVERMEXIN FORTE L.A.**, Antiparasitario endectosida vitaminado
Pg. 10 **IVERMEXIN PREMIUM**, Antiparasitario endectosida, Anabólico
Pg. 10 **IVERCLOR F**, Antiparasitario interno y externo - Fasciolida
Pg. 10 **IVERVIT L.A.**, Antiparasitario endectosida multivitaminado

SUSPENSIÓN ORAL

Pg. 12 **FENTRIMEC COMPLEX**, Fasciolida, nematicida y tenicida con efecto energizante
Pg. 12 **VERMINEX ULTRA**, Fasciolida, nematicida y tenicida con minerales y aminoacidos
Pg. 12 **LEVACLOSAN FORTE**, Fasciolida, nematicida y tenicida con efecto energizante, vitaminado
Pg. 13 **EQUIGUARD**, Antihelmintico oral de amplio espectro para Equinos

POLVO SOLUBLE

Pg. 14 **TILOBIOT**, Antibiótico de amplio espectro
Pg. 14 **TILOBIOT D**, Antibiótico de amplio espectro y expectorante
Pg. 14 **CLORACYN**, Antibiótico, mucolítico y expectorante
Pg. 15 **SULFAPRIM K**, Antibacteriano y Anticoccidiano
Pg. 15 **LYNCOMICIN-40**, Antibacteriano lincosamínico
Pg. 15 **SHOT C**, Antibiótico vitaminado
Pg. 16 **CUVITA NF Antistress**, Complejo vitaminico más electrolitos
Pg. 16 **ASCARICYN**, Antiparasitario Interno
Pg. 16 **FEBENMAX 5%**, Antiparasitario de amplio espectro
Pg. 17 **NUTRISAL ADE**, Suplemento mineral con vitamina ADE

SOLUCIÓN ORAL

Pg. 18 **IVERMEXIN ORAL**, Antiparasitario interno y externo
Pg. 18 **CUBITA B ORAL**, Suplemento vitaminico más Electrolitos
Pg. 18 **ENROCU 10% ORAL**, Antibiótico flouroquinoleico
Pg. 19 **ENROCU 20% ORAL**, Antibiótico flouroquinoleico
Pg. 19 **CIPROBROX ORAL**, Antibacteriano, mucolítico y expectorante

GUIA PRACTICA PARA EL CONTROL Y TRATAMIENTO DE
 ENFERMEDADES MAS COMUNES

GANADO VACUNO					
ENFERMEDAD	AGENTE	SINTOMAS	TRATAMIENTO	DOSIS	VIA DE ADM.
Pneumonia Bovina	Pasteurella, Streptococcus, Mycoplasma	Fiebre, anorexia, disnea, tos, secreción nasal.	TILOBIOT FORTE ENRO CU L.A. 20 OXIPLUS K TILOBIOT D TILOBIOT G BRONCOVET	1 mL / 15 kg de p.v. 1 mL / 40 kg de p.v. 1 mL / 10 kg de p.v. 10 g / 5 L de agua. 2 mL / 15 a 20 kg de p.v 1 mL / 10 kg de p.v.	I.M I.M I.M o I.V. Oral I.M. I.M.
Gastroenteritis infecciosa	Escherichia Coli, Salmonelosis, Clostridium	Fiebre, diarrea acuosa y mal oliente, anorexia, agalaxia.	SULFATEK SULFAPRIM K ENROCU L.A. 20% TILOBIOT FORTE	1 mL / 15 kg de p.v. 10 g / 5 L de agua. 1 mL / 40 kg de p.v. 1 mL / 15 kg de p.v.	I.M. Oral I.M. I.M.
Fasciolosis	Fasciola hepática	Debilidad, anorexia, diarrea, timpanismo, perdiada de peso, pelaje hirsuto.	IVERCLOR F FENTRIMEC COMPLEX VERMINEX ULTRA LEVACLOSAN FORTE	1 mL / 50 kg de p.v. 1 mL / 10 kg de p.v. 1 mL / 10 kg de p.v. 2.5 mL / 10 a 15 kg de p.v.	S.C. Oral Oral Oral
Parasitosis	Internos y externos	Anorexia y perdida de peso. Incoordinación, pelo hirsuto.	IVERMEXIN FORTE L.A. IVERMEXIN PREMIUM IVERVIT L.A.	1 mL / 50 kg de p.v. 1 mL / 50 kg de p.v. 1 mL / 60 kg de p.v.	S.C. I.M. S.C.
Fiebre de Leche	Enfermedad metabólica post-parto (hipocalcemia)	Fiebre alta, debilidad postración, shock y muerte.	CALCIO MDG NUTRICAL COLOIDAL	250 a 500 mL / animal 10 a 15 mL / animal	I.M. I.M.
Incremento de la producción y fertilidad	Vitaminas y minerales	Disminución de la producción de leche y baja fertilidad. Letargo en los animales	VITAD3E NUTRICAL COLOIDAL FOSFOSIN 34.1 NUTRISAL ADE	5 mL / vaca 10 a 15 mL / vaca 10 mL / vaca 30 a 60 g / animal	I.M. I.M. I.M. S.C. Oral
Convalecencia y recuperación		Animales post-tratamientos antibacterianos, traumas, debilidad, entre otros	CUBITA-B INYECTABLE VIGOR MAX ATP HIERROMAX 12 H-DEXTRAN PLUS	10 a 20 ml / animal 4mL / 100 kg de p.v. 3mL / animal 3mL / animal	I.M. I.V I.M. S.C. I.V I.M.. I.M.

GANADO OVINO / ALPACAS					
ENFERMEDAD	AGENTE	SINTOMAS	TRATAMIENTO	DOSIS	VIA DE ADM.
Neumonía Ovinos y Alpacas	Pasteurella, Streptococo, pneumoniaes, Mycoplasma. M. haemolitica.	Fiebre, anorexia, respiración rápida, tos, secreción nasal, mucosas cianóticas	ENRO CU 10% OXIPLUS K TILOBIOT D TILOBIOT G BRONCOVET	1 mL / 20 kg de p.v. 1 mL / 10 kg de p.v. 10 g / 5 L de agua 2 mL / 15 a 20 kg de p.v. 1 mL / 20 kg de p.v.	I.M. I.M. Oral I.M. I.M.
Gastroenteriti infecciosa	Escherichia Coli, Salmonelosis, Clostridium	Fiebre, diarrea acuosa, anorexia, agalaxia, enteroolitis aguda, dolor abdominal, timpanismo	SULFATEK SULFAPRIM K ENRO CU 10%	1 mL /15 kg de p.v. 10 g / 5 L de agua 1 mL / 20 kg p.v.	I.M. Oral I.M.
Fasciolasis	Fasciola hepática	Debilidad, anorexia, diarrhea, timpanismo	IVERCLOR F FENTRIMEC COMPLEX VERMINEX ULTRA LEVACLOSAN FORTE	1 mL / 50 kg de p.v. 1 mL / 12 kg de p.v. 1 mL / 10 kg de p.v. 0.5 mL / 2 kg de p.v.	S.C. Oral Oral Oral
Parasitosis interna y externa	Ascaris summ, Acaros , piojos, garrapata, Haemonchus, Eimeria, cestodos	Anorexia y perdida de peso, descompensación diarrea, colitis, cólicos y timpanismo y Anorexia	IVERMEXIN L.A. 1.2% FEBENMAX 5% VERMINEX ULTRA LEVOCLOSAN FENTRIMEC COMPLEX	0.5 mL / 30 kg de p.v. 1 g / 5 kg p.v. 1ml / 10kg p.v 1 mL / 4 kg p.v 1mL / 12kg p.v	S.C. Oral Oral Oral Oral
Enterotoxemia	Clostridium perfringes	Temblores, convulsiones, distensión abdominal, dolor	ENRO CU 10% SULFARPIM K	0.5 mL / 10 kg de p.v. 10 g / 5 L agua	I.M. Oral
Incremento de la producción y fertilidad	Vitaminas y minerales	Disminución de la producción, leche y baja fertilidad	VITAD3E NUTRICAL COLOIDAL FOSFOSIN 34.1 CALCIO MDG	3 mL /animal 5 mL /animal 1 mL / 50 kg p.v. 10-40 ml / animal	I.M. I.M. I.M. S.C I.M S.C. I.V
Convalecencia y recuperación	Vitaminas y minerales	Animales convalecien-tes, con poco apetito, adoloridos , aun débiles	CUBITA B INYECTABLE VITD3E VIGOR MAX ATP NUTRASAL ADE	10 a 20 mL / animal 3 mL / animal 1.2 mL /20 kg p.v. 10-15 g / animal	I.M S.C. I.V I.M. I.M S.C. I.V Oral

La información contenida en este documento relativa al uso de medicamentos para enfermedades comunes se proporciona exclusivamente con fines referenciales y comerciales. Este contenido no constituye ni reemplaza la orientación, diagnóstico o tratamiento del médico veterinario. Se recomienda consultar a un profesional de la salud animal calificado antes de iniciar, modificar o suspender cualquier tratamiento farmacológico. Las dosis, efectos adversos y contraindicaciones pueden variar en función de la edad, el estado de salud y las condiciones particulares de cada animal tratado. Bajo ninguna circunstancia debe ignorarse la recomendación médica profesional ni retrasarse la búsqueda de atención sanitaria a causa de la información aquí expuesta.

GANADO PORCINO					
ENFERMEDAD	AGENTE	SINTOMAS	TRATAMIENTO	DOSIS	VIA DE ADM.
Neumonía enzootica	Pasteurella, Mycoplasma hyopneumoniae, actinobacillus bordetella, haemophilus	Fiebre, anorexia, respiración rápida, disnea, tos, secreción, mucosas cianóticas.	TILOBIOT FORTE TILOBIOT D BRONCOVET TILOBIOT G	1 mL / 15 kg p.v. 10g / 5 kg alimento 1 mL / 10 kg de p.v. 2 mL / 15 a 20 kg de p.v.	I.M. Oral I.M. I.M.
Disentería porcina	Brachyspera hyodysenteriae	Diarrea sanguinolenta y mal olientes, enterocolitis agudas	TILOBIOT FORTE TILOBIOT D LYNCOMICIN	1 mL / 15 kg p.v. 10 g /5 kg alimento 12.5 a 25 mg / 1 kg de p.v.	I.M. Oral Oral
Anemia en lechones	Anemia ferropenica Hipocromico-microcítico	Pálidos, acumulación liquido garganta, pecho, diarrea, descondinación, debilidad	HIERRO MAX 12 H-DEXTRAN PLUS	1 mL / lechón 1 mL / lechón	I.M. I.M..
Parasitosis	Internos y externos	Anorexia y pérdida de peso	IVERMEXIN L.A. 1,2 IVERVIT L.A.	0,5 mL/ 20 kg p.v. 0,5 mL/20 kg p.v.	S.C. S.C.
Parasitosis interna	Áscaris summ, Trichuris	Anorexia, diarrea	FEBENMAX 5 % ASCARICYN	1 g / 8 kg p.v. 1 g / 5 kg p.v.	Oral Oral
Incremento de la producción y fertilidad	Vitaminas y minerales	Disminución de la producción de leche y baja fertilidad	VITAD3E NUTRICAL COLOIDAL	1 a 3 mL /animal 5 mL /animal	I.M. I.M.

AVES					
ENFERMEDAD	AGENTE	SINTOMAS	TRATAMIENTO	DOSIS	VIA DE ADM.
Coriza infecciosa	Haemophilus paragallinarum	Cara hinchada, secreción nasal, anorexia, problema respiratorio	SULFAPRIM K SHOT C	10 mL/5 L agua 10g/10 kg alimento	Oral Oral
Neumonías	Chlamydia psittaci, Ornithobacterium rhinotrachale (Ornitobacteriosis),	Insuficiencia respiratoria, mucosas cianóticas, dificultad para deglutir, secreciones respiratorias	LYNCOMICIN-40, SHOT-C TILOBIOT D	7.5 a 15 mg / kg de p.v. 10g / 10 kg alimento 10 g / 5 L de agua	Oral Oral Oral
Parasitosis	Internos y externos	Anorexia y pérdida de peso	IVERMEXIN ORAL	4 gotas / ave	Oral
Parasitosis interna	Áscaris, Trichuris	Anorexia, diarrea	FEBENMAX 5 %	10g / 20 kg alimento	Oral
Avitaminosis	Vitaminas y minerales	Suplemeto nutricional	CUVITA NF	10 g / 20 L agua	Oral
Enteritis necrótica	E. coli, Salmonella, C. perfringens, Campylobacter jejuni, Pasteurella spp., Klebsiella spp., y Chlamydophilia psittaci.	Inapetencia, deshidratación y diarrea mal oliente y sanguinolenta	LYNCOMICIN-40 SHOT C	7.5 a 15 mg / kg de p.v. 10 g / 10 kg de alimento	Oral Oral

CUYES					
ENFERMEDAD	AGENTE	SINTOMAS	TRATAMIENTO	DOSIS	VIA DE ADM.
Salmonelosis	Salmonella	Septicemia, anorexia, parálisis tren posterior, diarreas sanguinolentas	CIPROBROX SULFAPRIM K	5 gotas / cuy adulto 10 g / 4 kg de alimento	Oral Oral
Neumonía infecciosa	Estreptococcus, Bordetella, Salmonella	Secreción, disnea, anorexia , muerte repentina	TILOBIOT D	10g / 4 a 5 kg alimento	Oral
Linfadenitis	Estreptococcus	Ganglio linfático inflamado, dificultad para comer o tragar, decaimiento, fibre	SULFAPRIM K SHOT C	10 g / 5 L agua 10g / 10 kg alimento	Oral Oral
Parasitosis	Internos y externos	Anorexia, diarrea y pérdida de peso, apopecia	IVERMEXIN ORAL	2 a 3 gotas / cuy	Oral
Parasitosis interna	Áscaris, Trichuris	Anorexia, diarrea, perdida de peso, caída de pelo	FEBENMAX 5 %	10g / 5 a 10 kg alimento	Oral

GANADO EQUINO					
ENFERMEDAD	AGENTE	SINTOMAS	TRATAMIENTO	DOSIS	VIA DE ADM.
Parasitosis interna	Teniasis (cestodos) Trematodos Strongylus spp y Oxyuris equi	Diarreas , decaimiento, disminución del peso y la condición corporal	EQUIGUARD	4g / 100 kg p.v.	Oral

TILOBIOT FORTE

Antibiótico, antiinflamatorio y antihistamínico de amplio espectro, alta concentración y fuerza sinérgica

Solución estéril inyectable, que contiene dos antibióticos, un antiinflamatorio corticoide y un antihistamínico. Indicado para todos tipos de infecciones respiratorias, digestivos y reproductivos.

Bovinos: Pleuroneumonía, neumonías, fiebre de transporte, mastitis, pododermatitis, neumoenteritis de los terneros, onfalitis, metritis, septicemias infecciones urinarias, traqueobronquitis.

Porcinos, ovinos, caprinos, camélidos: Colibacilosis, salmonelosis, bronconeumonías, neumonía enzootica, disentería porcina, erisipela porcina.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

Bovinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos, porcinos: 1mL/15 kg de peso vivo, por vía intramuscular profunda durante 3 a 5 días consecutivos.

Gallos de pelea: 0.5 a 1mL/6 kg de peso vivo, por vía subcutánea o intramuscular .

PRESENTACIONES: 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL

COMPOSICIÓN: Tilosina Tartrato: 15 g - Gentamicina Sulfato: 6 g - Dexametasona 21 fosfato: 0.0265 g - Clorfenamina maleato: 0.750 g -Excipientes c.s.p.: 100 mL



ESPECIES DE DESTINO:



TILOBIOT G

Asociación antibiótica sinérgica macrólido + aminoglucósido de amplio espectro

Solución estéril inyectable, indicado para todo tipos de infecciones respiratorias, digestivos y reproductivos. **Bovinos:** Pleuroneumonía, neumonías, fiebre de transporte, mastitis, pododermatitis, neumoenteritis de los terneros, onfalitis, metritis, septicemias infecciones urinarias, traqueobronquitis. **Porcinos, ovinos, caprinos, camélidos:** Colibacilosis, salmonelosis, bronconeumonías, neumonía enzootica, disentería porcina, erisipela porcina, rinitis atrofica. **Aves:** Enfermedad respiratoria crónica (ERC), sinusitis, Colibacilosis, coriza infecciosa, Salmonelosis.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

Aves: 0.2 a 0.5 mL por 5-6 kg de p.v. por vía subcutánea durante 3 días.

Bovinos, porcinos, camélidos sudamericanos, ovinos y caprinos: 2.0 mL del producto por cada 15 a 20 kg de p.v. por vía intramuscular durante 5 días.

Caninos y felinos: 1 mL por 5 kg de p.v.

PRESENTACIONES: 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL

COMPOSICIÓN: Tilosina Tartrato: 2.5 g - Gentamicina Sulfato: 3 g Excipientes c.s.p.: 100 mL



ESPECIES DE DESTINO:



BRONCOVET

Antibiótico, mucolítico, expectorante y antihistamínico de amplio espectro

Inyectable estéril que contiene doxiciclina, una tetraciclina sintética de amplio espectro, eficaz contra bacterias, micoplasmas, rickettsias y ciertos protozoos. La bromhexidina contribuye a la fluidificación y expulsión de secreciones en afecciones bronquiales. La clorfenamina actúa como antihistamínico. Está indicada para el tratamiento de infecciones del aparato respiratorio, digestivo, urinario, genital y de la piel.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Intramuscular profunda.

Bovinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos, porcinos: 1 ml por cada 10 kg de peso vivo, repitiéndose la dosis a las 24 horas y durante 3-5 días consecutivos si fuera necesario.

PRESENTACIONES: 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL

COMPOSICIÓN: Doxiciclina (hclato):. 200 mg - Bromhexina (clorhidrato): 5.0 mg Clorfenamina (maleato): 5.0 mg - Excipientes c.s.p.: 1 mL



ESPECIES DE DESTINO:



ENRO CU 10%

Antibiótico flouroquinoleico de amplio espectro

Inyectable estéril, contiene Enrofloxacin, fluoroquinolona de amplio espectro; indicado para el tratamiento y profilaxis de enfermedades infecciosas causadas por bacterias Gram +, Gram – y Micoplasmas. *Bovinos*: Colibacilosis, salmonelosis, enterotoxemia, neumonía, bronconeumonías, metritis, mastitis. *Ovinos*, *camélidos sudamericanos*, *caprinos*: Problemas respiratorios, digestivos, dermatológicos, enterotoxemia. *Porcinos*: Diarrea de los lechones, colienterotoxemia, salmonelosis, neumonía enzoótica, bronconeumonías, rinitis atrófica, síndrome MMA (mastitis, metritis agalactia).

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Se aplica por vía intramuscular profunda o subcutánea.

Bovinos, ovinos, porcinos, caprinos y camélidos sudamericanos: 1 mL por cada 20 kg de p.v.

Caninos y felinos: 0,1 mL por 2 kg de peso vivo.

Aves: 0,5 mL por cada 5 kg de p.v.

PRESENTACIONES: 10 mL, 20 mL, 50mL, 100 mL, 250 mL

COMPOSICIÓN: Enrofloxacin: 10 g - Excipientes c.s.p.: 100 mL



ESPECIES DE DESTINO:



ENROCU L.A. 20

Antibiótico flouroquinoleico de amplio espectro y larga acción



ESPECIES DE DESTINO:



Inyectable estéril que contiene enrofloxacin, una fluoroquinolona de amplio espectro, indicada para el tratamiento y la prevención de enfermedades infecciosas provocadas por bacterias Gram positivas, Gram negativas y Micoplasmas. Tras su administración, mantiene concentraciones terapéuticas en sangre durante al menos 3 días. *Bovinos*: colibacilosis, salmonelosis, enterotoxemia, neumonía, bronconeumonías, metritis y mastitis. *Ovinos*, *caprinos* y *camélidos sudamericanos*: afecciones respiratorias, digestivas, dermatológicas y enterotoxemia. *Porcinos*: salmonelosis, neumonía enzoótica, bronconeumonías, rinitis atrófica y síndrome MMA (mastitis, metritis, agalactia).

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

Bovinos, ovinos, caprinos, porcinos: (vía intramuscular o subcutánea) 1 mL/40 kg de p.v.

Camélidos (alpacas): (vía intramuscular o subcutánea) 1 mL/40 kg de p.v.

Aves: (vía intramuscular) 0.10 mL/2 kg de p.v.

PRESENTACIONES: 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL

COMPOSICIÓN: Enrofloxacin: 20 g - Excipientes c.s.p.: 100 mL

OXIPLUS K

Combinación antibiótica antiinflamatoria no esteroide de amplio espectro y larga acción

Inyectable estéril que combina oxitetraciclina, antibiótico bacteriostático de amplio espectro, y ketoprofeno, un antiinflamatorio no esteroide que no presenta efectos abortivos. Una sola aplicación permite mantener concentraciones terapéuticas en sangre durante 3 a 5 días, lo que la hace adecuada para el tratamiento de infecciones agudas. *Bovinos*: anaplasmosis, carbunco (ántrax), clostridiosis, brucelosis, artritis, leptospirosis, enteritis, neumonía, bronconeumonías, metritis, mastitis, peritonitis, peder, queratoconjuntivitis y abscesos. *Ovinos*, *caprinos* y *camélidos sudamericanos*: carbunco (ántrax), clostridiosis, fiebre de las alpacas, mastitis, peder, septicemia umbilical, queratoconjuntivitis y abscesos.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Se administra vía intramuscular profunda o subcutánea. Bovinos, ovinos, porcinos, caprinos y camélidos sudamericanos: 1 mL por cada 10 kg de peso vivo durante 3 a 5 día consecutivos.

PRESENTACIONES: 20 mL, 50mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL

COMPOSICIÓN: Oxitetraciclina HCL: 20 g - Ketoprofeno: 3 g - Excipientes c.s.p.: 100 mL



ESPECIES DE DESTINO:



SULFATEK

Quimioterápico bactericida de amplio espectro

Indicado para el tratamiento de infecciones respiratorias, gastrointestinales, genitourinarias, piel y articulaciones. No utilizar en hembras gestantes o lactancia. **Bovinos:** Colibacilosis, salmonelosis, neumonías, septicemias, pasteurelosis, actinomicosis, abscesos. **Equinos:** Diarrea del potro, neumonías, paperas, piosepticemias. **Ovinos, caprinos:** Neumonías, enfermedad transporte, enteritis, septicemias, coccidiosis, abscesos, mastitis. **Porcinos:** Colibacilosis, salmonelosis, disentería porcina, neumonías, abscesos. **Aves:** Salmonela, *E.coli*, coccidiosis, enteritis,

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Bovinos (por vía IV o IM) y equinos (por vía IM): 20 - 30 mL. Vaquillas y potros: 5 -15 mL.

Porcinos: 6 – 12 mL. Lechones y gorrinos 1 – 2 mL

Camélidos, ovinos, caprinos: 3 – 5 mL. Tuis, corderos, cabritos: 1 – 2 mL.

Aves, cuyes y conejos: 0,5 – 1 mL por 6 kg de p.v.

Duración: 3 a 5 días consecutivos.

PRESENTACIONES: 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL

COMPOSICIÓN: Sulfadiazina Sódica: 200 mg - Trimetoprim: 40 mg - Vitamina K: 10 mg - Excipientes c.s.p.: 1 mL



ESPECIES DE DESTINO:



HIERRO MAX 12

Suplemento reconstituyente, mineral vitaminado para la prevención y tratamiento de anemias de tipo hipocrómico-microcítico

Indicado para la profilaxis y tratamiento de la anemia ferropénica (microcítica e hipocrómica). Su formulación está reforzada con vitamina B12, la cual desempeña un papel esencial en la estimulación de la hematopoyesis en lechones. Además, actúa como coadyuvante en el manejo de anemias de diversa etiología, incluyendo las secundarias a hemorragias, disenterías y parasitosis en animales domésticos.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Administrar por vía intramuscular únicamente.

Lechones: Tratamiento preventivo y curativo: 1 mL. 2° – 3° día de edad.

Repetir a los 14 días si es necesario.

Terberos, ovinos, caprinos: 2 mL. Repetir a la semana si es necesario.

Bovinos adultos: 3 mL cada 7 días según sea necesario.

Caninos: 0,1 – 0,3 mL/kg peso vivo.

PRESENTACIONES: 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL

COMPOSICIÓN: Hierro Dextrano: 200 mg - Cianocobalamina: 60 mcg - Excipiente c.s.p.: 1 mL



ESPECIES DE DESTINO:



H-DEXTRAN PLUS

Suplemento reconstituyente, mineral vitaminado.

Formulación inyectable a base de hierro dextrano, vitamina B12, cobre y cobalto, destinada a estimular la eritropoyesis y favorecer la producción de glóbulos rojos. Indicada para la profilaxis y tratamiento de la anemia ferropénica en lechones, así como coadyuvante en el manejo de anemias de diversa etiología (hemorragias, disenterías, parasitosis) en animales domésticos.

ADMINISTRACIÓN: Administrar por vía intramuscular únicamente.

Bovinos: 2.0 mL - 4.0 mL (Adulto), 1.5 mL - 3.0 mL (Terberos).

Equinos: 2 mL - 4 mL (Adultos), 1.5 mL - 3 mL (Potros).

Ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos: 1 mL - 2 mL.

Lechones: 1 mL ocasionalmente durante el 2do y 4to día de edad. Repetir a la segunda semana.

PRESENTACIONES: 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL

COMPOSICIÓN: Hierro Dextrano : 200.0 mg - Cloruro de Cobalto : 10.0 mcg
Cloruro de Cobre: 2.0 mg - Vitamina B12 (Cianocobalamina): 50.0 mcg
Excipiente c.s.p.: 1.0 mL



ESPECIES DE DESTINO:



VITAD3E

Reconstituyente nutricional

Es un concentrado vitamínico inyectable, biodisponible, combina las vitaminas A, D3, E en una solución aguamisible que garantiza una rápida absorción y una larga duración de sus efectos, formulado para atender las necesidades y afecciones del ganado en sus diferentes etapas reproductivas. **Metabólicas:** Hipocalcemia, cetosis, raquitismo, osteomalacia y musculo blanco. **Reproductivas:** Infertilidad, muerte embrionaria retención de placenta, preparación en el empadre. **Infecciosas:** Coadyuvante en diarreas, neumonías, mastitis, metritis. **Producción:** Bajo rendimiento en ganado de lechero y engorde, etapas de estrés o vacunación.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Se administra vía intramuscular o subcutánea. Bovinos y Equinos: 3 a 5 mL / Terneros y Potros: 1 a 2 mL / Porcinos, Ovinos y Caprinos: 1 - 3 mL / Camélidos Sudamericanos: 1 a 3 mL / Caninos y Felinos: 0,25 a 0,5 mL / Aves: 0,1 mL (pollos) - 0,25 (adultas)
Se recomienda repetir la dosis cada 3 a 4 meses.

PRESENTACIONES: 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL

COMPOSICIÓN: Vitamina A: 50.000.000 U.I. - Vitamina D3: 7.500.000 U.I. Vitamina E: 5 g - Excipientes c.s.p.: 100 mL



ESPECIES DE DESTINO:



CALCIO MDg

Calcificante, mineralizante, energético y estimulante;

Indicado en la prevención y tratamiento de la fiebre de la leche (hipocalcemia, hipofosfatemia, hipomagnesemia) y en casos de deficiencia de calcio, fosforo y magnesio. Asimismo, en casos de cetosis, raquitismo, tetania de pastos (envenenamiento por forrajes), intoxicaciones, deficiencias en general y como tónico reconstituyente.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Se aplica de preferencia vía intravenosa, también puede usarse vía intramuscular y subcutánea a no más de 30 mL por punto de aplicación. Bovinos: 500 – 750 mL / Equinos: 250 – 500 mL. / Ovinos: 10 – 40 mL / Porcinos: 50 – 100 mL / Repetir de ser necesario.
De ser necesario, repetir la misma dosis a las 24 horas, previa evaluación del Médico Veterinario tratante.

PRESENTACIONES: 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL

COMPOSICIÓN: Burogluconato de calcio: 270 mg - Burogluconato de magnesio: 70 mg - Dextrosa: 300 mg - Fósforo elemental: 5 mg - Cloruro de potasio: 2 mg - Cafeína: 5 mg - Excipientes c.s.p. : 1 mL



ESPECIES DE DESTINO:



NutriCal COLOIDAL

Reconstituyente Premium Vitaminado y Mineralizado

Solución inyectable, vitamínica y mineralizante. Se administra en casos de desequilibrios nutricionales, recalcificante, revitalizante, gestación, lactancia, crecimiento, raquitismo, hipocalcemia, actúa como coadyuvante en casos de infecciones bacterianas, virales y parasitarias. Disminuye el estrés, favorece la conversión alimenticia y promueve un rápido crecimiento.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Intramuscular profunda. Bovinos y equinos: 10-15 mL - Terneros y potrillos: 5-10 mL Ovinos, caprinos y Camélidos sudamericanos: 3 - 5 mL - Porcinos: 5 mL - Aves, cuyes y conejos: 0,5 - 1 mL

PRESENTACIONES: 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL

COMPOSICIÓN: Cloruro de calcio: 3.60 Eq - Vitamina A: 7 000 000 UI - Vitamina B1: 0.03 mg - Vitamina B2: 0.15 mg - Vitamina B12: 7.00 mg - Vitamina C: 5.0 mg - Vitamina D3: 1 000 000 UI - Vitamina E: 500 mg - Fósforo: 70 mg - Magnesio: 8.50 mg - Zinc: 0.30 mg - Potasio: 147 mg - Sodio: 43 mg - Excipientes c.s.p.: 100 mL



ESPECIES DE DESTINO:



VIGORMAX ATP

Energizante, Estimulante metabólico

Reconstituyente de uso general, indicado para el manejo de cuadros anémicos y procesos de convalecencia asociados a enfermedades infecciosas, parasitarias o intoxicaciones. Asimismo, contribuye a contrarrestar estados de debilidad, estrés y fatiga, siendo especialmente recomendado en la preparación de animales destinados a competencias o sometidos a trabajos extremos.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Agitar bien el producto antes de usar.

Bovinos y Equinos (de 360 kg a 500 kg): 10 a 12 mL por vía I.M., S.C., E.V.

Terneros y Potrillos (de 40 kg a 360 kg): 5 a 10 mL por vía I.M., S.C.

Camélidos sudamericanos, Ovinos y Caprinos: 5 mL por vía I.M., S.C.

Porcinos: de 2 kg a 10 kg: 1 mL, de 10 a 20 kg: 2 mL, de 20 kg a 50 kg: 5 mL,


Mayor a 50 kg: 10 mL, solo por vía I.M., S.C.

Caninos: 1 mL/5kg de p.v. por vía S.C.

Aves y Cuyes: 0.5 mL/2.5 de p.v. por vía S.C.

PRESENTACIONES: 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL

COMPOSICIÓN: Adenosin trifosfato (ATP):1 mg - Glicerofosfato de sodio: 20 mg - Cianocobalamina: 0,012 mg - Cobalto acetato: 0,5 mg - Triptofano: 2.5 mg - Histidina: 5 mg - Metionina: 10 mg - Hierro: 20 mg - Cacodilato de sodio: 30 mg - Tiamina clorhidrato: 5 mg - Riboflavina 5 fosfato: 2 mg - Nicotinamida: 50 mg - Piridoxina clorhidrato: 10 mg - Excipientes c.s.p.:1 mL



ESPECIES DE DESTINO:



FOSFOSIN 34.1

Reconstituyente mineral



Tónico reconstituyente con acción estimulante del apetito y reguladora del metabolismo. Indicado en estados de debilidad y agotamiento posteriores a partos difíciles, así como en la corrección de trastornos del crecimiento. Útil en casos de deficiencias derivadas de alimentación inadecuada, sequías o sobrecarga de pastoreo. Actúa como coadyuvante en el tratamiento de la esterilidad y alteraciones del ciclo estral en vacas, así como en la impotencia sexual de toros. También se recomienda en trastornos del desarrollo óseo, raquitismo, osteomalacia, fracturas, fiebre de la leche, tetania y paresia.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Vía intramuscular y subcutánea. Se recomienda su aplicación en la tabla del cuello

Bovinos: 1 mL por cada 50 k de peso vivo.

Porcinos: 1 ml por cada 30 k de peso vivo.

PRESENTACIONES: 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL

COMPOSICIÓN: Glicerofosfato de sodio (5.5 H₂O): 14.00 g - Fosfato monosódico (2H₂O): 20.10 g - Cloruro de cobre (2H₂O): 0.40 g - Cloruro de potasio: 0.60 g - Cloruro de magnesio (6H₂O): 2.50 g - Selenio: 0.05 g - Excipientes c.s.p.: 100 mL

ESPECIES DE DESTINO:



CUVITA B INYECTABLE

Suplemento vitamínico a base de Vitaminas del Complejo B, Nicotinamida y Pantenol

Esta indicado en caso de debilidad en general, desgaste físico, retardo del crecimiento, anorexia, anemia, neuritis, neuralgias, polineuritis, nerviosismo, Incoordinación de los miembros del tren anterior y posterior, calambres y nerviosismo. Neuritis, neuralgias, pieloneuritis, ataxia, irritabilidad, dermatitis, trastornos gastrointestinales.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Se administra vía intramuscular o intravenosa.

Bovinos y equinos: 10 mL - 20 mL

Ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos, terneros y potrillos: 5 mL - 10 mL

Porcinos: lechones 1 mL, gorrinos 2 mL a 5mL, marranas y verracos 10 mL

Caninos: 1 mL a 5 mL - Felinos: 0,5 mL

Gallos de Pelea: 0.3 a 0.5 mL

PRESENTACIONES: 10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL

COMPOSICIÓN: Piridoxina HCL: 0.15 g - Rivo flavina: 0.22 g - Tiamina HCL: 3.10 g - Cianocobalamina: 0.012 g - Nicotinamida: 2.00 g - Pantenol: 0.46 g - Excipiente c.s.p.: 100 mL



ESPECIES DE DESTINO:



IVERMEXIN PREMIUM

Antiparasitario interno y externo, anabólico de alto rendimiento.

Antiparasitario de amplio espectro para el control de endoparásitos gastro-intestinales, pulmonares redondos, en sus fases adultas y larvianas; asimismo en el control de ectoparásitos como como la incidencia de moscas causantes de la miasis, piojos chupadores, garrapatas y sarna común del bovino. La boldenona, anabólico de acción prolongada, actúa captando todo el nitrógeno biodisponible para convertirlo en proteína.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Se administra vía intramuscular únicamente.

Bovinos: 1 mL por cada 50 kg de p.v.

Repetir la dosis de 90 a 120 días si es necesario.

PRESENTACIONES: 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL

COMPOSICIÓN: Ivermectina: 40.0 mg - Boldenona: 20.0 mg - Excipientes c.s.p.: 1.0 ml



ESPECIES DE DESTINO:



IVERMEXIN FORTE L.A.

Endectocida vitaminado de amplio espectro y larga acción



ESPECIES DE DESTINO:



Inyectable estéril en vehículo oleoso de acción prolongada, indicado para el tratamiento y control de parasitosis internas y externas del ganado bovino. *Parásitos internos:* Combate eficazmente los nematodos gastrointestinales y pulmonares en sus fases adultas y larvianas, al mismo tiempo que previene su reinfestación por más tiempo. *Parásitos externos:* Es utilizado con gran efectividad en la incidencia de la mosca causante de la miasis, piojos chupadores, garrapatas y sarna común del bovino. Adiciona en su formulación vitamina B12, coadyuvante de anemia y convalecencia parasitaria.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Se administra únicamente por vía subcutánea (tabla del cuello).

Bovinos, ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos: 1 mL de IVERMEXIN FORTE L.A., por cada 50 kg de p.v.

Repetir la dosis de 90 a 120 días si es necesario.

PRESENTACIONES: 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL

COMPOSICIÓN: Ivermectina: 3.15 g - Vitamina B12: 5.0 mg - Excipientes c.s.p.: 100 mL

IVERMEXIN L.A.

Endectocida de amplio espectro y larga acción

Solución inyectable estéril en vehículo oleoso de larga acción. Antiparasitario de amplio espectro para el control y tratamiento simultaneo de parásitos internos (nematodos gastrointestinales y pulmonares) y parásitos externos (larvas de insectos, piojos masticadores y ácaros).

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: La vía de administración es subcutánea.

Porcinos: 1 mL del producto por 40 kg de peso vivo.

Bovinos, ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos: 1 mL del producto por 60 kg de peso vivo.

PRESENTACIONES: 10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL

COMPOSICIÓN: Ivermectina: 1.2 g - Excipientes c.s.p.: 100 mL



ESPECIES DE DESTINO:



IVERCLOR F

Endectocida y fasciolicida de amplio espectro

IVERCLOR F, solución inyectable endectocida y **fasciolicida** indicado en el tratamiento, control y profilaxis de parásitos internos y externos, incluyendo *Fasciola hepática*, nematodos gastrointestinales y pulmonares. Ectoparásitos como estados larvarios de dípteros (causantes de miasis), piojos chupadores y masticadores, garrapatas y ácaros productores de sarna. Adiciona en su formulación la vitamina B12 como coadyuvante en cuadros de anemia y convalecencia parasitaria.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Se administra vía subcutánea (tabla del cuello). Bovinos, ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos: 1 mL del producto por 50 kg de peso vivo

PRESENTACIONES: 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL

COMPOSICIÓN: Ivermectina: 1g - Clorsulón: 10g - Vitamina B12: 30 mcg
Excipientes c.s.p.: 100 mL



ESPECIES DE DESTINO:



IVERVIT L.A.

Endectocida vitaminado de larga acción

Antiparasitario endectocida de amplio espectro y larga acción (L.A.) el cual posee una persistente actividad en el organismo de animal. La asociación de Ivermectina con vitaminas liposolubles (A, D3 y E) provee una respuesta efectiva contra alteraciones metabólicas y nutricionales. Las Vitaminas A, D3 y E también ayudan al mantenimiento basal y funcional del organismo animal, incorporando elementos necesarios para ello, los cuales son desbalanceados por el daño parasitario.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Se administra únicamente por vía subcutánea. Bovinos, Ovinos y Caprinos: 1 mL por cada 60 kg de p.v.
Porcino: 1 mL por cada 40 kg de p.v.

PRESENTACIONES: 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL

COMPOSICIÓN: Ivermectina: 1.2 g - Vitamina A: 5.000.000 U.I. - Vitamina D3: 40.000 U.I. - Vitamina E: 1.000 U.I. - Excipientes c.s.p.: 100 mL



ESPECIES DE DESTINO:



- Mayor rendimiento • Mejor producción • Protección total



RAPIDA
DISTRIBUCIÓN

ALTA
BIODISPONIBILIDAD

MAYOR
PRODUCCIÓN



NUEVA LÍNEA ANTIPARASITARIA

Contra Fasciola
hepática,
parásitos internos
y externos



FENTRIMEC COMPLEX

Fasciolicida, nematicida y tenicida con efecto energizante

Antiparasitario oral, de amplio espectro y gran eficacia contra las formas juveniles y adultas de **Fasciola Hepática o distomatosis** y contra nemátodos gastrointestinales, pulmonares y tenias. La asociación con minerales (selenio, cobalto y cobre) ayudan a prevenir la anemia, mejora el pelaje, la lana y la piel. También mejora el nivel reproductivo, incrementan la ganancia de peso corporal y conversión alimenticia, y disminuye la excreción de nitrógeno urinario. Posee gran poder ovicida y eficaz contra larvas inhibidas (hipobioticas) de *Ostertagia* spp resistentes.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Se administra por vía oral.

Bovinos: 1 ml por 10 kg de peso vivo.

Ovino, Caprino, Camélido sudamericano: 1 ml por 12 kg de peso vivo

PRESENTACIONES: Geringa x 30 mL, Frascos x 250 mL, 500 mL y 1 L

COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:

Triclabendazole: 12.0 g - Fenbendazol: 10.0 g, Praziquantel: 5.0 g -

Selenio: 20.0 mg, Sulfato de Cobalto: 100.0 mg - Cobre: 50 mg.



ESPECIES DE DESTINO: 

VERMINEX ULTRA

Fasciolicida, nematicida y tenicida con de amplio espectro y enriquecido con minerales y aminoácidos

Antiparasitario oral, indicado para el control y tratamiento de formas adultas y juveniles de *Fasciola hepática* o distomatosis, nematodos gastrointestinales (incluidas las larvas inhibidas o hipobióticas), nemátodos pulmonares, *Tenias*: *Moniezia* spp., larvas de *Oestrus ovis* (gusano de la nariz). La combinación de cobalto y aminoácidos en su formulación actúa como coadyuvante de la convalecencia de enfermedades parasitarias, estimula la síntesis de la vitamina B12, mantiene las funciones orgánicas, previene anemias y mejora el nivel reproductivo. Tiene efecto energizante y estimula el apetito en el animal parasitado. Puede ser administrado en animales de cualquier edad, hembras gestantes y animales altamente parasitados.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Se administra unicamente por vía oral.

Bovinos, Ovino, Caprino, Camélido sudamericano: 1 ml por cada 10 kg de p.v

PRESENTACIONES: Geringa x 30 mL, Frascos x 250 mL, 500 mL y 1 L

COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:

Rafoxanide: 10.0 g - Fenbendazole: 10.0 g - Sulfato de Cobre: 0.10 g -

Cobalto: 0.10 g - Sulfato de Zinc: 3.0 g - Metionina: 0.70 g - Lisina: 0.47 g.



ESPECIES DE DESTINO: 

LEVACLOSAN FORTE

Fasciolicida, nematicida y tenicida con efecto energizante, vitaminado

Antiparasitario oral, de amplio espectro y gran eficacia para el tratamiento y control de infestaciones por fascioliasis, Paramphistomiasis, nematodos gastrointestinales y pulmonares; del hígado, órganos gastrointestinales y pulmonares respectivamente en ganado bovino, ovino y caprino. El levamisol causa un aumento del tono muscular axial seguido de parálisis de los gusanos. El oxiclozanide es un salicilanilida y actúa contra trematodos, nematodos chupadores de sangre y larvas de hypoderma y oestrus spp. Es un tratamiento alternativo donde se ha desarrollado resistencia a otros medicamentos antihelmíntico.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Se administra unicamente por vía oral.

Bovinos: 2.5 mL / 10 kg de p.v. - Ovinos y Caprinos: 0.5 mL / 2 kg de p.v.

PRESENTACIONES: Geringa x 30 mL, Frascos x 250 mL, 500 mL y 1 L

COMPOSICIÓN: Cada mL contiene:

Oxyclozanide: 60.0 mg - Levamisol Hydrochloride: 30.0 mg -

Vitamina B12: 0.05 mg.



ESPECIES DE DESTINO: 

EQUIGUARD

Antihelmíntico oral de amplio espectro para Equinos

EQUIGUARD, es indicado para:

- Tratamiento de infestaciones mixtas de caballo debido a vermes redondos gastrointestinales pulmonares, vermes planos (tenias) y gastrofilos tanto adultos como larvas.
- Posee gran poder ovicida y es eficaz contra larvas arrestadas o inhibidas (hipobioticas).
- Mayor efectividad contra formas inmaduras y adultas de todo tipo de tenias (cestodes) con efecto escolicida, tenicida y además actúa contra *cisticercos* viables.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Se administra vía oral.

Equinos: 4 g/100 kg de peso vivo.

COMPOSICIÓN: Cada 100 g contiene:

Fenbendazol: 22.5 g - Ivermectina: 0.6 g - Praziquantel: 7.5 g

Vitamina B12: 2.0 mg

PRESENTACIONES: Jeringa x 30 g



ESPECIES DE DESTINO:



Las **enfermedades parasitarias** ocupan el primer problema de salud y productividad en la práctica veterinaria; combatirlas exige un enfoque estratégico según la especie, su función productiva (leche o carne) y los parásitos endémicos en la región. En **CUVITA Animal Health**, no solo entendemos este desafío: lo enfrentamos con soluciones eficaces y adaptadas a cada realidad.

Nuestro compromiso es claro—liberar a nuestros rumiantes de estos organismos y devolverles la vitalidad que merecen.



Fórmulas exitosas para el criador **EXITO**

TILOBIOT

Antibióticos de amplio espectro que actúan principalmente contra diversos organismos, Gram positivos y Gram negativos, incluyendo de esta manera, Estreptococos, Estafilococos, Corynebacterium y Clostridium, Haemophilus, Bordetella, Pasteurella, Clamidas, Rickettsias y Mycoplasma.

Aves: Enfermedades respiratorias crónicas causadas por Microplasma Gallisepticum, Coriza infecciosa (moquillo), Bronquitis, Sinusitis, Colibacilosis y Sinovitis.

Cerdos - Ovinos: Neumonía Diarrea de origen infecciosa, Afecciones gastrointestinales, Disenteria Vibriónica, Enteritis.

Bovinos - Equinos: Neumonía, Bronconeumonía, Septicemia, Sinusitis.

DOSIFICACIÓN: Vía oral mezclada en agua de bebida o en alimentos.

Aves y conejos: 10 g en 4 L de agua durante 5 días.

Porcinos, ovinos y camélidos sudamericanos: 10 g en 4 L de agua durante 5 días consecutivos.

Bovinos: 2 g por cada 20 kg de p.v. durante 5 días.

PRESENTACIONES: Caja dispensadora x 50 sbs x 12 g, Sobre de 100 g, 500 g, 1k

COMPOSICIÓN: Tilosina tartrato: 5 g - Oxitetraciclina HCL: 10 g
Excipiente c.s.p.: 100 g



ESPECIES DE DESTINO:



TILOBIOT D

Antibiótico de amplio espectro, de acción rápida y prolongada la cual actúa principalmente contra diversos organismos, Gram positivos y Gram negativos, incluyendo de esta manera, Estreptococos, Estafilococos, Corynebacterium y Clostridium, Haemophilus, Bordetella, Pasteurella, Clamidas, Rickettsias y Mycoplasma.

Aves: Enfermedades respiratorias crónicas causadas por Microplasma Gallisepticum, Coriza infecciosa (moquillo), Bronquitis, Sinusitis, Colibacilosis y Sinovitis.

Porcinos y ovinos: Neumonía Diarrea de origen infecciosa, Afecciones gastrointestinales, Disenteria Vibriónica, Enteritis.

Bovinos - equinos: Neumonía, Bronconeumonía, Septicemia, Sinusitis.

DOSIFICACIÓN: Vía oral mezclada en agua de bebida o en alimentos.

Aves: 1000 g en 2000 L de agua de bebida o 1000 g por TM de alimento, durante 3-5 días consecutivos

Porcinos: 1 gr por 10 k de peso vivo, durante 3-5 días consecutivos

Terneros pre-rumiantes: 1 gr por 10 k de peso vivo, durante 4-5 días consecutivos

PRESENTACIONES: Caja dispensadora x 50 sbs x 10 g, Sobre de 100 g, 500g, 1 k

COMPOSICIÓN: Doxiciclina: 200 g - Tilosina Tartrato: 50 g - Bromhexina: 5 g -
Excipientes c.s.p.: 1000 g



ESPECIES DE DESTINO:



CLORACYN

Antibiótico de amplio espectro a base de Florfenicol, el cual adiciona en su composición la Bromhexina, expectorante mucolítico que aumenta las secreciones bronquiales y disminuye su viscosidad, favoreciendo la recuperación del animal. Esta indicado en el tratamiento y control de infecciones producidas por bacterias Gram-positivas y Gram-negativas en cerdos y aves.

DOSIFICACIÓN: Vía oral mezclada en agua de bebida o en alimentos.

Para uso en agua de bebida: 100 mg del producto por cada kilo de p.v.

En el alimento: 1 k del producto por TM de alimento.

Mantener el tratamiento por 5 días en el agua de bebida y 7 días en alimentos.

PRESENTACIONES: Caja dispensadora x 50 sbs x 10 g, Sobre de 100 g, 500 g, 1 k

COMPOSICIÓN: Florfenicol: 10 g - Bromhexina clorhidrato: 0.5 g -
Excipientes c.s.p.: 100 g



ESPECIES DE DESTINO:



SULFAPRIM K

Potente combinación antimicrobiana de alta fuerza sinérgica, Sulfaquinoxalina Sódica más Trimetoprim para el control efectivo de los procesos infecciosos de microorganismos Gram positivos y Gram negativos así como contra coccidias. Es también reforzado con vitamina K, la cual favorece a la coagulación, previene y controla el sangrado y la hemorragia en los animales.

DOSIFICACIÓN: Disolver en agua de bebida:

Aves, cuyes y conejos: 0,5 – 1 g/l de agua durante 5 días (35 a 45 mg por kg p.v.).

Cerdos: 1 g/L de agua durante 3 – 5 días

Bovinos, ovinos y caprinos: 0,6 g /10 kg de p.v. durante 3 – 5 días.

En el alimento: 1000 g del producto por TM de alimento.

PRESENTACIONES: Caja dispensadora x 50 sbs x 10 g, Sobre de 100 g, 500 g, 1 k

COMPOSICIÓN: Sulfaquinoxalina Sódica: 20 g - Trimetoprim: 8 g -

Vitamina K: 0.2 g - Excipiente c.s.p.: 100 g



ESPECIES DE DESTINO:



LYNCOMICIN-40

Antibacteriano lincosamínico. Actúa inhibiendo la síntesis proteica al unirse a la subunidad 50S ribosomal. Dependiendo de la sensibilidad de los microorganismos y la concentración del antibacteriano, su actividad puede ser bactericida o bacteriostática. Pollos de engorde: para el control de la enteritis necrótica causada por *Clostridium perfringens*. Porcino: para el tratamiento de la Disentería porcina causada por *Brachyspira (Serpulina) hyodysenteriae*.

DOSIFICACIÓN: Vía oral disuelta en el agua de bebida limpia o en alimentos según las indicaciones. Preparar la solución al momento de su uso.

Porcinos (Disentería porcina): Administrar 12.5 - 25 mg del producto por kg de peso vivo un en mínimo de 5 días y un máximo de 10 días consecutivos.

Aves (Enteritis necrótica): Administrar 7.5 mg a 15 mg del producto por kg p.v durante 7 días consecutivos.

Debe determinarse el peso de los animales con la mayor exactitud posible para poder evitar una dosificación insuficiente.

En el alimento: 1,5 k del producto por TM de alimento.

PRESENTACIONES: Caja dispensadora x 50 sbs x 10 g, Sobre de 100 g, 500 g, 1 k

COMPOSICIÓN: Lincomicina hidrocloreto: 40 g - Excipientes c.s.p.: 100 g



ESPECIES DE DESTINO:



SHOT C

SHOT C, producto elaborado a base de eficaces antibióticos de amplio espectro e importantes vitaminas efectivas en el tratamiento de enfermedades respiratorias, gastrointestinales y genitourinarias en todas las especies.

DOSIFICACIÓN: Vía oral mezclada en agua de bebida o en alimentos.

Aves: 10 g en 4 Lt de agua durante 5 días.

Porcino, canino, ovino, caprino y camélido sudamericano:

10 g por 10 kg de p.v. durante 5 días.

Bovino y equino: 10 g por 40 kg de p.v. durante 5 días.

Canino: 10 g por 10 kg de p.v. durante 5 días.

PRESENTACIONES: Caja dispensadora x 50 sbs x 10 g, Sobre de 100 g, 500 g, 1 k

COMPOSICIÓN: Oxitetraciclina HCL: 10 g - Florfenicol: 5 g - Vitamina A: 300,000 UI - Vitamina E: 500 UI - Vitamina C: 400 mg - Vitamina B1: 300 mg - Vitamina B2: 300 mg - Vitamina B3: 250 mg - Vitamina B6: 300 mg - Vitamina B12: 6 mg - Excipiente c.s.p.: 100 g



ESPECIES DE DESTINO:



CUVITA NF

Suplemento alimenticio a base de vitaminas hidrosolubles, y reforzado con Pantotenato de calcio, Acido folico, Cloruro de Sodio, Cloruro de potasio y Sulfato de Magnesio que participan en el metabolismo intermediario de muchas reacciones esenciales en el organismo del animal, cuyas carencias originan bajos rendimientos y lo predisponen a diversas enfermedades. También es importante en la prevención y tratamiento de enfermedades como: La Avitaminosis, Micototoxicosis, Trastornos digestivos y estrés, estimula el apetito, crecimiento y fertilidad, favoreciendo la calidad productiva de carne y huevos. Actúa como tratamiento paralelo en procesos de convalecencia.

DOSIFICACIÓN: Vía oral mezclada en agua de bebida o en alimentos.

Aves: 1 g por 2 litros de agua de bebida durante 5-7 días consecutivos

Terneros, equinos, caprinos y porcinos: 1 g por cada 10 k de p.v.

Conejos, cuyes, perros y gatos: 2 g por litro de agua de bebida.

En el alimento: 20 k del producto por TM de alimento.

PRESENTACIONES: Caja dispensadora x 50 sbs x 10 g, Sobre de 100 g, 500 g, 1 k

COMPOSICIÓN: Vitamina B1: 8 g - Vitamina B2: 10 g - Vitamina B6: 10 g - Vitamina B12: 0.015 g - Ácido Fólico: 1.8 g - Pantotenato de Calcio: 5 g - Cloruro de Sodio: 80 g - Cloruro de Potasio: 34 g - Sulfato de Magnesio: 7 g - Excipientes c.s.p.: 1,000 g



ESPECIES DE DESTINO:



ASCARICYN

Antiparasitario interno efectivo contra las Ascariasis específicas de los animales. Porcino: *Ascaris Suum* (también conocido como gusano redondo grande) Equino: *Parascaris Equorum* (produce trastornos de tipo digestivos, cólicos y retraso en su desarrollo). Bovino: *Toxocara Vitulorum* (Neo-ascaris – Nematodo gastrointestinal de mayor reproducción en regiones cálidas. Se pueden alojar en el intestino delgado, pulmones, tráquea, esófago, hígado, riñones, etc.). Ovino: *Ascaris Suum* o en raras ocasiones *Ascaris Lumbricoides* (Nematodo parásito del intestino delgado). Caninos y Felinos: *Toxocara Canis*, *Toxocara cati*.

DOSIFICACIÓN: Vía oral mezclada en agua de bebida o en alimentos.

Aves y animales menores: 10 g en 4 litros de agua por 50 aves

Porcinos: 1 g por 5 k de p.v.

Equinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos y bovinos: 1 g x cada 6 kg de p.v.

Canino y felino: 1 g x cada 6 kg de p.v.

PRESENTACIONES: Caja dispensadora x 50 sbs x 12 g, Sobre de 100 g, 500 g, 1 k

COMPOSICIÓN: Piperazina Diclorhidrato: 550 g - Excipiente c.s.p.: 1,000 g



ESPECIES DE DESTINO:



FEBENMAX 5%

Antihelmíntico de amplio espectro eficaz contra estadios maduros e inmaduros de los Céstodos de aves y Nemátodos gastrointestinales y pulmonares de aves y cerdos. *Cerdos:* contra estadios maduros e inmaduros de *Hyostrogylus rubidus*, *Ascaris suum*, *Oesophagostomun spp.*, *Stephanurus dentatus*, *Trichuris suis*, *Metastrongylus spp.* *Aves:* contra estadios maduros e inmaduros de *Ascaridia galli*, *Heterakis gallinarum*, *Capillana osignata* y estados maduros de *Taenia spp.*

DOSIFICACIÓN: Vía oral mezclada en los alimentos según las indicaciones.

Porcinos: Administrar un sobre de 10 g para un animal de 80 k de p.v. por 3 días consecutivos. Repetir la dosis cada 6 semanas.

Aves: Administrar 1 sobre de 10 g mezclado con 20 kg de alimento o por cada 40 aves, por 4 días consecutivos. Repetir cada 45 días.

Debe determinarse el peso de los animales con la mayor exactitud posible para evitar una dosificación insuficiente.

PRESENTACIONES: Caja dispensadora x 50 sbs x 10 g, Sobre de 100 g, 500 g, 1 k

COMPOSICIÓN: Fenbendazole: 5 g - Excipientes c.s.p.: 100 g



ESPECIES DE DESTINO:



NUTRISAL ADE

Suplemento mineral para la alimentación animal, formulado con alto contenido de fósforo y calcio enriquecido con micro y macrominerales, vitaminas A, D y E, necesarios para cubrir los requerimientos nutricionales en las etapas más exigentes: crecimiento, trabajo, producción y reproducción (preñez, lactancia). Favorece la salud y el metabolismo ruminal permitiendo una mejor utilización de proteínas y energía en la dieta. Optimiza los parámetros productivos y reproductivos. Corrige las deficiencias por dietas restringidas o desequilibradas.

DOSIFICACIÓN: Vía oral, mezclado con la ración diaria de alimento, con sal común o dosificado individualmente.

Vacas en producción: 30-60 g/animal/día - Bovinos de engorde y vacas en seca: 15-30 g/animal/día - Equinos: 30-45 g/animal/día - Ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos: 10-15 g/animal/día - Porcino: 10-15 g/animal/día - Terneros y caninos: 5-10 g/animal/día - Conejos y cuyes: 1.5-3 g/animal/día - Aves: 15 g para 10 gallinas, 5 g para 10 pollitos.

PRESENTACIONES: sobre de 500 g, balde de 1 kg, 4 kg, bolsa por 10 kg, 20 kg

COMPOSICIÓN: Calcio: 210 g - Fosforo: 146 g - Magnesio: 5 g - Sodio: 61.9 g - Cloruros: 80 g - Manganeso: 4 g - Zinc: 5 g - Selenio: 50 mg - Azufre: 3.840 g - Cobre: 1.550 g - Hierro: 1.200 mg - Potasio: 31 g - Yoduros: 100 mg - Cobalto: 60 mg - Vitamina A: 500.00 UI - Vitamina D3: 60,000 UI, Vitamina E: 500 UI, Excipientes c.s.p.: 1 kg



ESPECIES DE DESTINO:



Por que son parte de nuestra familia
deja su salud en nuestras manos



IVERMEXIN ORAL

Indicado en la prevención, control y tratamiento de parásitos internos (*Ascaridia galli* y *Capillaria spp*). Y para infestaciones causadas por parásitos externos como: ácaros y piojos, en aves de corral. Reduce las poblaciones de escarabajos (*Alphitobium diaperinus*) presentes en la cama.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

AVES: 0,5 mL/L de agua de bebida o 1 mL/20-25 kg peso vivo /2 días consecutivos. Repetir a los 7 o 15 días según criterio del Médico Veterinario tratante. La dosis, los días de tratamiento y los intervalos entre dosis se ajustan de acuerdo al criterio del Médico Veterinario.

PERÍODO DE RETIRO: Carne: 8 días - Huevos: 0 días

PRESENTACIONES: Gotero x 20 mL, Frascos x 250 mL, 500 mL y 1 L

COMPOSICIÓN: Ivermectina: 1 g - Excipientes c.s.p.: 100 mL



ESPECIES DE DESTINO:



CUBITA B ORAL

Suplemento alimenticio recomendado para prevenir deficiencias vitamínicas. Está indicado en casos de trastornos digestivos, respiratorios, intoxicaciones, reacciones post-vacunales, daño hepático, hemorragias, diarreas y trastornos intestinales, casos de tensión, estrés y debilidad en general. Favorece el crecimiento del animal, mejora el emplumaje, la fertilidad y producción de huevos.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Se administra vía oral en el agua de bebida.

Pollos y gallinas: 0,5 mL por litro de agua de bebida durante 3 a 5 días.

Pavos: 0,25 mL de litro de agua durante 3 a 5 días.

Porcino: 1 mL por kilogramo de p.v. durante 3 a 5 días.

PRESENTACIONES: Gotero x 20 mL, Fracos x 250 mL, 500 mL y 1 L

COMPOSICIÓN: Vitamina B1: 0.5 g - Vitamina B2: 0.6 g - Vitamina B12: 2.5 mcg
Niacina: 1.6 g - Biotina: 2.0 mg: - Ácido fólico: 25.0 mg - Vitamina C: 0.5 g
Vitamina D3: 0.8 g - Vitamina K3: 0.2 g - Pantotenato de calcio - 0.6 g -
Cloruro de sodio: 2.2 g - Cloruro de potasio: 3.4 g - Excipiente c.s.p.: 100.0 mL



ESPECIES DE DESTINO:



ENRO CU 10% ORAL

Antibacteriano que pertenece a la clase de Fluoroquinolonas, actúa contra un amplio espectro de bacterias Gram positivas, Gram negativas, así como *Mycoplasma spp*.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Se administra vía oral en el agua de bebida y acorde a la cantidad de agua que se consumirá en un periodo de 24 horas.

Pollos y Pavos: 0,1 mL de ENROCU 10% ORAL por kg de p.v. durante 3 a 5 días.

Bovinos (terneros) y Cerdos (lechones): 0,025 - 0,05 mL de ENROCU 10% ORAL por kg de p.v. durante 3 a 5 días.

PERÍODO DE RETIRO:

Carne: Bovinos y porcinos: 28 días.

Carne: Aves (pollos, gallinas y pavos): 10 días.

PRESENTACIONES: Gotero x 20 mL, Fracos x 250 mL, 500 mL y 1 L

COMPOSICIÓN: Enrofloxacin: 10 g - Excipientes c.s.p.: 100 mL



ESPECIES DE DESTINO:



ENRO CU 20% ORAL

Está indicado en el tratamiento y control de enfermedades producidas por bacterias Gram positivas, Gram negativas y *Mycoplasmas*, tales como infecciones respiratorias, urinarias, intestinales y dérmicas.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Se administra vía oral en el agua de bebida.
Aves: Dosis recomendada es de 0,05 mL del producto por kg de peso vivo durante 3 a 7 días de tratamiento.

Equinos, bovinos, porcinos, caprinos y ovinos: Dosis recomendada es de 0,5 mL por 50 kg de p.v. cada 24 horas durante 3 a 7 días de tratamiento.

Perros y gatos: Dosis recomendada es de 5-20 mg por kg de p.v. por día. Puede ser administrada en una ocasión al día o dividida en dos ocasiones cada 12 horas. El tratamiento deberá continuar por al menos 2 a 3 días más allá del cese de los signos clínicos.

PRESENTACIONES: Gotero x 20 mL, Fracos x 250 mL, 500 mL y 1 L

COMPOSICIÓN: Enrofloxacin: 20 g - Excipientes c.s.p.: 100 mL



ESPECIES DE DESTINO:



ESPECIES DE DESTINO:



CIPROBROX

Asociación de Ciprofloxacina, que actúa contra bacterias Gram positivas, Gram negativas y *Mycoplasmas* en aves y otra especie; además, está asociada a la Bromhexina; mucolítico que ayuda a descongestionar las vías respiratorias que están acompañadas por moco y flema.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Administrar por vía oral, directamente en el pico o en el agua de bebida.

Aves: 10-20 mg/kg de peso vivo. Uso de gotero: 1 gota en pollos de 7 días, 2 gotas en pollos de 15 días, 4 gotas en aves adultas.

Cuyes y Conejos: 8 gotas en un tratamiento de 3 a 5 días.

Porcinos: 1 mL por 32 kg de peso vivo durante 3 a 5 días.

En el agua de bebida, se recomienda como dosis de tanque 1 mL por litro de agua y como dosis de mantenimiento 1 mL en 2 litros de agua de bebida.

PRESENTACIONES: Gotero x 20 mL, Fracos x 250 mL, 500 mL y 1000 mL

COMPOSICIÓN: Ciprofloxacina: 20 g - Bromhexina: 0,5 g - Excipientes c.s.p.: 100 mL


Contamos con certificación **GMP** (BPM - Buena Practicas de Manufactura).

Estamos comprometidos en cumplir los estándares de calidad según las normativas internacionales.



MAS DE
25
AÑOS
EN LA INDUSTRIA





LABORATORIO CUVITA S.R.L.

Av. Carlos Izaguirre 697, Lima 39 - Perú

Central telefónica: (51) 999 898 579

info@laboratoriocuvita.com

ventas@laboratoriocuvita.com

SÍGUENOS EN NUESTRA REDES SOCIALES:

