

ENROCU 10% ORAL[®]

Uso Veterinario

Antibiótico bactericida

Solución Oral

FÓRMULA:

Cada 100 mL contiene:

Enrofloxacin 10 g

Excipientes. c.s.p..... 100 mL



INDICACIONES:

ENROCU 10% ORAL contiene Enrofloxacin, antibacteriano perteneciente a las fluoroquinolonas.

Pollos: *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma synoviae*, *Avibacterium paragallinarum*, *Pasteurella multocida* y *E. coli*. Pavos: *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma synoviae*, *Pasteurella multocida* y *E. coli*. Cerdos (lechones): *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Haemophilus parasuis*, *Streptococcus suis*, *Mycoplasma hyopneumoniae* y *E. coli*. Bovinos (Terberos): *Mannheimia haemolytica*, *Mycoplasma bovis*, *Pasteurella multocida*, *Salmonella* y *E. coli*.

ESPECIES DE DESTINO:

Aves, Cerdos y Bovinos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

Administrar por vía oral, directamente en el pico o en el agua de bebida y acorde a la cantidad de agua que se consumirá en un periodo de 24 horas..

Aves (Pollos, gallinas y pavos): 0,1 mL del producto (equivalente a 10 mg de Enrofloxacin) por kg de p.v.; durante 3 a 5 días.

Cerdos y Bovinos: 0.025 - 0.05 mL del producto (2,5 - 5,0 mg de Enrofloxacin) por kg de p.v.; durante 3 a 5 días.

La dosis, los días de tratamiento y los intervalos entre dosis se pueden ajustar de acuerdo al criterio del Médico Veterinario tratante. Cualquier factor que afecte el consumo podría modificar los niveles de efectividad del producto.

PERIODO DE RETIRO:

Carne: Bovinos, ovinos, caprinos y porcinos: 28 días.

Carne: Aves (pollos, gallinas y pavos): 10 días.

No administrar a ponedoras que se encuentren en producción de huevos para consumo humano.

No administrar en vacas en producción láctea para consumo humano.

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO:

Constante por cada 24 horas, durante un periodo entre 3-5 días consecutivos, hasta la recuperación de los animales.

PRECAUCIONES:

No administrar en animales sensibles a Enrofloxacin. Por vía oral, la administración simultánea de sustancias que contengan magnesio, calcio y aluminio puede reducir la absorción de la Enrofloxacin.

El recipiente no tiene que estar deteriorado, ni roto. Una vez abierto el envase, descartar el producto sobrante no utilizado. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Usarse sólo como se indica.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:

Se recomienda diluir el producto en agua de bebida con una adecuada homogeneidad y preparar una nueva dilución cada 24 horas para garantizar la efectividad del producto.

ALMACENAMIENTO:

Manténganse en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar directa. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. La temperatura y la humedad son factores negativos para la estabilidad del producto. Almacenar a no menos de 15°C y no más de 30°C en promedio. Usarse como se indica. Laboratorio CUVITA S.R.L. no se responsabiliza por el mal almacenamiento del producto.

PRESENTACIONES:

Gotero por 20 mL, Frascos x 250 mL, 500 mL, 1 L

ENROCU 10% ORAL es una marca registrada de



Fabricado y distribuido por:

Laboratorio CUVITA S.R.L.

Av. Carlos Izaguirre N° 697, Lima 39 - Perú

Tel.: (51) 999 898 579

Email: Info@laboratoriocuvita.com

Web: laboratoriocuvita.com

Profesional Responsable:

Dra. Susana Terrones Gil - C.M.V. 15102

REG.SENASA: F.082.032.N.00820

VENTA BAJO RECETA MEDICA