

ASCARICYN®

Uso Veterinario

Antiparasitario Interno

Polvo soluble

FÓRMULA:

Cada 1,000 g contiene:	
Piperacina Diclorhidrato	550 g
Excipiente c.s.p.	1,000 g



INDICACIONES:

ASCARICYN es un fármaco derivado de la Piperacina, efectivo contra larvas y huevos de Ascaris específica en el animal. La Piperacina promueve la expulsión de *Ascaris* vivos teniendo un efecto predominante sobre áscaris adultos y con muy buenos resultados en todas las especies. Su método de acción se manifiesta por la producción de parálisis flácida debido al bloqueo de la acetilcolina a nivel de placa neuromuscular del parásito. Finalmente el parásito es expulsado por los movimientos propios del intestino.

Aves: *Ascaris galli* (también conocidos como gusanos fecales – *Heterakis gallinae*).

Porcino: *Ascaris Suum* (también conocido como gusano redondo grande).

Equino: *Parascaris Equorum* (Es una parasitosis provocada por un áscaris algo frecuente en los equinos sobre todo en los animales de menos de 2 años; produce trastornos de tipo digestivos, cólicos y retraso en su desarrollo).

Bovino: *Toxocara Vitulorum* (Neo-ascaris – Nematodo gastrointestinal de mayor reproducción en regiones cálidas. Se pueden alojar en el intestino delgado, pulmones, tráquea, esófago, hígado, riñones, etc.).

Caninos y Felinos: *Toxocara canis* y *Toxicara cati* (es una infección zoonótica cosmopolita proveniente de perros y gatos respectivamente, migran erráticamente por todo el cuerpo causando reacciones inflamatorias).

ESPECIES DE DESTINO:

Aves, Porcinos, Equinos, Bovinos, Caprinos, Camélidos Sudamericanos, Ovinos, Caninos y Felinos

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

Vía oral disuelta en el agua de bebida limpia o en alimentos según las indicaciones. Preparar la solución al momento de su uso. Preparar soluciones frescas que serán consumidas dentro de las 12 horas

En agua de bebida:

Aves y animales menores: 10 g en 4 litros de agua por 50 aves

Porcinos: 1 g por 5 kg de peso vivo.

Equinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos y bovinos: 1 gr x cada 6 kg de peso vivo.

Canino y felino: 1 g x cada 6 kg de peso vivo.

En alimentos:

Aves, animales menores, porcinos: Mezclar 200 g en 100 kg de alimento.

La dosis, los días de tratamiento y los intervalos entre dosis se pueden ajustar de acuerdo al criterio del Médico Veterinario tratante. Cualquier factor que afecte el consumo podría modificar los niveles de efectividad del producto.

PRECAUCIONES: No administrar en aves productoras de huevos para consumo humano. No suministrar al ganado lechero en proceso de lactación.

INTERVALO ENTRE DOSIS:

En aves se recomienda repetir a los 7 y 14 días después del primer tratamiento. En las demás especies de destino se recomienda repetir a los 21 días del tratamiento, o indicación expresa del médico veterinario tratante.

PERIODO DE RETIRO:

Carne: 21 días

Leche: 6 días (no usar durante días de tratamiento).

No usar en aves de postura en producción de huevos.

CONTRAINDICACIONES:

No usar en animales con alteraciones de tipo hepático, renal o con historial de ataques generalizados tónico-clónicos.

No usar en animales debilitados o caquécticos.

ADVERTENCIAS:

No usar en aves cuyos huevos se destinen para uso humano.

No suministrar al ganado lechero en lactación.

Se deben evitar las siguientes prácticas puesto que incrementan el riesgo de desarrollo de resistencia y que en último caso, la terapia resulte ineficaz:

El uso frecuente y repetido de los antihelmínticos de una misma clase o durante un extenso periodo de tiempo.

La infradosificación, que puede ser debida a una estimación incorrecta del peso corporal, mal uso del medicamento o falta de calibración del aparato dosificador.

Ante la sospecha de casos clínicos en los que se aprecie resistencia a un determinado antihelmíntico se debe investigar este hecho mediante los oportunos ensayos (p.ej Test de reducción del recuento de huevos en heces).

Cuando los resultados indiquen de forma clara la resistencia a un antihelmíntico en particular, se debe administrar un antihelmíntico de otro grupo farmacológico o con un mecanismo de acción diferente.

ALMACENAMIENTO:

Manténganse en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar directa. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. La temperatura y la humedad son factores negativos para la estabilidad del producto. Almacenar a no menos de 15°C y no más de 25°C en promedio. Usarse como se indica. Laboratorio CUVITA S.R.L. no se responsabiliza por el mal almacenamiento del producto.

PRESENTACIONES:

Caja dispensadora de 50 sobres de 12 gramos, Sobre por 50 gramos, Sobre por 100 gramos, Sobre por 500 gramos, Sobre por 1 kilogramo, Bolsa por 5 kilogramos.

ASCARICYN es una marca registrada de:



Fabricado y distribuido por:

Laboratorio CUVITA S.R.L.

Av. Carlos Izaguirre N° 697, Lima 39 - Perú

Tel.: (51) 999 898 579

Email: Info@laboratoriocuvita.com

Web: laboratoriocuvita.com

Profesional Responsable:

Dra. Susana Terrones Gil - C.M.V. 15102

Reg. SENASA: F.08.70.N.1067

VENTA BAJO RECETA MEDICA