

BRONCOVET

Antibiótico, mucolítico, expectorante y antihistamínico

Solución Inyectable

FÓRMULA:

Cada 100 mL contiene:

Doxiciclina (hclato)..... 20.0 g
Bromhexina (clorhidrato) 0.5 g
Clorfenamina (maleato) 0.5 g
Excipientes c.s.p. 100 mL



INDICACIONES:

BRONCOVET es un antibacteriano de amplio espectro, mucolítico, expectorante y antiistaminico para el tratamiento de enfermedades respiratorias producidas por bacterias sensibles a la doxiciclina. La Doxiciclina es un un antibiótico semi-sintético perteneciente al grupo de las tetraciclinas de segunda generación; está indicado para el tratamiento de cuadros neumónicos, bronconeumonías, pasteurelosis complicadas. La Doxiciclina actúa inhibiendo la síntesis de proteína bacteriana, por tanto, su acción es bacteriostática, con efectiva acción sobre bacterias Gram negativas y Gram positivas, Micoplasmas, algunos anaerobios y tambien algunos protozoos. BRONCOVET posee efecto expectorante broncopulmonar y en asociación con la bromhexina actúa como mucolítico, de uso exclusivo en todo tipo de afecciones del tracto respiratorio. La bromhexina promueve la eliminación de las mucosidades pulmonares acumuladas y favorece el mecanismo defensivo natural del sistema respiratorio. Además, contiene clorfenamina como antihistaminico coadyuvante en procesos respiratorio.

Bovinos: para Bacterias grannegativas encargadas de desencadenar problemas intestinales, problemas respiratorios, problemas cutáneos entre otros, entre ellos tenemos *Pasteurella haemolytica*, *Pasteurella multocida* y *Mycoplasma bovis*, *Escherichia coli*, *Enterobacter aerogenes* (anteriormente *Aerobacter aerogenes*), *Shigella sp*, *Acinetobacter sp* (anteriormente *Mima sp* y *Herellea sp*), infecciones del tracto respiratorio causadas por *Haemophilus influenzae*, y del tracto urinario causadas por *Klebsiella sp*.

Ovinos caprinos y camélidos sudamericanos: para el tratamiento de bacterias gram negativas encargadas de desencadenar problemas intestinales, problemas y respiratorios tales como *actinomyces spp*, *Clostridium spp.*, *Listeria monocytogenes*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Ornithobacterium rhinotracheale*, *Corynebacterium spp.*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Campylobacter spp.*, *Haemophilus spp.*, *Escherichia coli*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Bordetella spp.*, *Brucella spp.*, *Pasteurella spp.*, *Salmonella spp.* así como micoplasmas, espiroquetas, clamidia y rickettsias.

Porcinos: Indicado para Gram positivos, Gram negativas, micoplasmas, clamidias, rickettsias y algunos protozoos *Pasteurella multocida*, *Bordetella bronchiseptica* y/o *Mycoplasma hyopneumoniae*

VIA DE ADMINISTRACION:

Intramuscular profunda

Bovino: 0.75 mL / 10 kg de p.v. (equivalente a 150 mg doxiciclina hclato, 3.75 mg de bromhexina clorhidrato y 3.75 mg de clorfenamina maleato) repitiéndose la dosis a las 24 horas. **Porcinos:** 0.5 mL / 10 kg de p.v. (equivalente a 100 mg de doxiciclina hclato, 2.5 mg de bromhexina clorhidrato y 2.5 mg de clorfenamina maleato) repitiéndose la dosis a las 24 horas. **Ovino, caprinos y camélidos sudamericanos:** 1mL /20 kg de p.v. (equivalente a 200 mg de doxiciclina hidrato, 5 mg de bromhexina clorhidrato y 5 mg de clorfenamina maleato), repitiéndose la dosis a las 24 horas. Repetir la dosis durante 3-5 días de ser necesario.

No inyectar más de 10 ml por punto de aplicación en bovinos adultos y no más de 5 ml en animales menores. En caso de requerir mayor volumen, divida la dosis.

Uso Veterinario

ESPECIES DE DESTINO:

Bovinos, porcinos, caprinos, ovinos y camélidos sudamericanos.

PERIODO DE RETIRO:

Bovinos, porcinos, ovinos y caprinos (carne): 28 días

Leche: No usar en animales cuya leche se destina para consumo humano.

REACCIONES ADVERSAS**DOXICICLINA:**

La Doxiciclina tampoco debe utilizarse en hembras lactantes ya que pasa en gran medida a la leche materna y de ahí a los cachorros. De esta manera puede causar problemas en los cachorros de tipo: hipoplasia dentaria, reacciones de fotosensibilidad e inhibición del crecimiento longitudinal del esqueleto.

CLORFENAMINA MALEATO:

El efecto secundario mas común es la somnolencia. En los gatos, este medicamento puede causar excitación en lugar sedación.

ALMACENAMIENTO:

Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa. Almacenar entre 15º y 30º C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Almacenar el producto en los recipientes originales cerrados, en una pieza con buena ventilación. El recipiente no tiene que estar deteriorado, ni roto.

PRECAUCIONES:

La solución debe ser transparente y no contener precipitado. No administrar en caso contrario. Una vez abierto el frasco, desechar la porción no utilizada de la solución. El contenido de cada envase es para un solo uso.

Romper el envase para evitar que lo vuelvan a usar. Eliminar las jeringas descartables usadas. Usarse solo como se indica.

Conserve las indicaciones de asepsia y antisepsia antes y durante la aplicación del producto. Laboratorio CUVITA S.R.L. no se responsabiliza por las consecuencias derivadas del uso (del producto) diferente al indicado en este inserto.

Manipule este producto con cuidado para evitar la exposición al mismo, tomando todas las precauciones recomendadas. Si en caso de una exposición al producto aparecen síntomas, como una erupción en la piel, debe buscar ayuda médica. Hinchazón de la cara, labios u ojos o dificultad para respirar son síntomas más graves y requieren atención médica urgente.

PRESENTACIONES:

Frasco de: 10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL.

Profesional Responsable:

Dra. Susana Terrones Gil - C.M.V. 15102



LABORATORIO CUVITA S.R.L.

Av. Carlos Izaguirre N°697, Lima 39 - Perú

Central Telefónica: (51) 999 898 579

Email: ventas@laboratoriocuvita.com

Venta bajo receta médica