

CLORACYN

Antibacteriano, mucolítico y expectorante

Polvo soluble

Uso Veterinario

FÓRMULA:

Cada 100 g contiene:

Florfenicol	10 g
Bromhexina clorhidrato	0.5 g
Excipientes c.s.p.	100 g



INDICACIONES:

CLORACYN, contiene Florfenicol y Bromhexina clorhidrato. El Florfenicol es un antibacteriano activo contra microorganismos gram positivos y gram negativos. Es activo frente a *Pasterurella haemolytica*, *P. Multocida*, *Haemophilus somnus*, *Enterobacter cloacae*, *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Salmonella typhi* y *Shigella disenteriae*. También presenta actividad frente a bacterias resistentes al cloranfenicol. La Bromhexina clorhidrato, mucolítico y expectorante coadyuvante para el tratamiento de afecciones del tracto respiratorio, que permiten disminuir la viscosidad de las secreciones, para ser movilizadas desde los pulmones. De esta manera, aumenta la llegada del antibacteriano al parénquima pulmonar, incrementando la acción de la terapia antimicrobiana.

ESPECIES DE DESTINO:

Aves (pollo de engorda, gallina reproductora y de postura) y Porcinos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Vía oral disuelta en el agua de bebida limpia según las indicaciones. Preparar la solución al momento de su uso.

DOSIFICACIÓN:

AVES: Usar 200 mg de CLORACYN (equivalente a 20mg de Florfenicol + 1 mg de Bromhexina clorhidrato) por Kg de p.v. por 3-5 días consecutivos.

PORCINOS: Usar 100 - 200 mg de CLORACYN (equivalente a 10-20mg de Florfenicol + 0,5 - 1mg de Bromhexina clorhidrato) por Kg de p.v. por 3-5 días consecutivos.

La dosis, los días de tratamiento y los intervalos entre dosis se ajustan de acuerdo al criterio del Médico Veterinario

PERIODO DE RETIRO:

Aves de engorde: 5 días

Cerdos: 28 días

No usar en aves de postura en producción de huevos.

ADVERTENCIAS:

Preparar soluciones frescas que serán consumidas dentro de las 12 horas. Manténganse en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar directa. La temperatura y la humedad son factores negativos para la estabilidad del producto. Almacenar a no menos de 15° y no más de 30°C en promedio. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Usarse como se indica. Laboratorio CUVITA S.R.L. no se responsabiliza por el mal almacenamiento del producto.

PRESENTACIONES:

Caja dispensadora de 50 sobres de 10 gramos

Sobre por 50 gramos

Sobre por 100 gramos

Sobre por 500 gramos

Sobre por 1 kilogramo

PRECAUSIONES:

No administrar este producto 5 días antes del sacrificio de animales destinados a consumo humano.

No administrar a aves ponedoras en producción.

No administrar en animales adultos destinados a la reproducción.

Evitar la mezcla con Tianfenicol ya que compiten con el mismo sitio de acción.

MECANISMO DE ACCIÓN

El Florfenicol produce el bloqueo de la síntesis proteica al ligarse a la porción 50 S del ribosoma inhibiendo la actividad de la peptidil transferasa lo que produce la muerte bacteriana.

La Bromhexina ejerce cierta acción estimulante de la secreción de las glándulas mucosas bronquiales. *In vitro* ejerce acción mucolítica por despolimerización de las sialomucinas con reducción de la viscosidad. Libera a la luz bronquial enzimas hidrolíticas de origen lisosómico y altera en consecuencia la trama fibrilar de los mucopolisacáridos ácidos.

CLORACYN es una marca registrada de:



Fabricado y distribuido por:

Laboratorio CUVITA S.R.L.

Av. Carlos Izaguirre N° 697, Lima 39 - Perú

Tel.: (51) 999 898 579

Email: Info@laboratoriocuvita.com

Web: laboratoriocuvita.com

SENASA-PERÚ: F.082.070.N.00711

SENASAG BOLIVIA: Reg. PUV - N°011785/23

Importado y distribuido en Bolivia por:

AGROSUIGEN

Profesional Responsable:

Dra. Susana Terrones Gil - C.M.V. 15102

VENTA BAJO RECETA MÉDICA