

ENROCU L.A. 20

Antibacteriano de Amplio Espectro

Solución Inyectable

FÓRMULA:

Cada mL contiene:

Enrofloxacin Base 20.0 g

Excipientes c.s.p. 100.0 mL



DESCRIPCIÓN:

ENROCU L.A. 20%, formulado en base a Enrofloxacin y antibiótico que pertenece a la clase química de las fluoroquinolonas (tercera generación). Su formulación ejerce una actividad bactericida mediante un mecanismo de acción basado en la inhibición de la sub-unidad A de la ADN-girasa (Topoisomerasa II) bacteriana, impidiendo la rotación axial negativa de la molécula de ADN es un potente antibacteriano de amplio espectro para el tratamiento y prevención de las enfermedades infecciosas producidas por bacterias Gram positivas, Gram negativas y Micoplasmas. ENROCU L.A. 20%, se absorbe y distribuye rápidamente en los tejidos manteniendo concentraciones terapéuticas altas en el organismo, por lo que es altamente eficaz incluso en infecciones sistémicas persistentes.

INDICACIONES:

BOVINOS:

Terberos: Diarreas y sepsis producidas por *E.Coli*, infecciones tracto respiratorio con *Pasteurella haemolytica* y *Mycoplasma bovis*, y en infecciones producidas por *Salmonella* spp.

Adultos: Actúa frente *Pasteurella* spp y *Mycoplasma* spp, en mastitis causadas por *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus* y *Mycoplasma bovis*, *Streptococcus* spp

OVINOS:

Mastitis causadas por *Staphylococcus aureus*, mastitis gangrenosa causadas por *Staphylococcus aureus* y *Clostridium perfringens*

CAMELIDOS SUDAMERICANOS (ALPACAS): Para infecciones suseptibles a la enrofloxacin, fiebre de la alpaca, coliterotoxemia y neumonía.

CAPRINO: Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio causadas por cepas de *Pasteurella multocida* y *Mannheimia haemolytica* sensibles al enrofloxacin. Tratamiento de enfermedades infecciosas del tracto digestivo causadas por cepas de *Escherichia coli* sensibles al enrofloxacin. Tratamiento de la septicemia causada por cepas de *Escherichia coli* sensibles al enrofloxacin. Tratamiento de la mastitis causadas por cepas de *Staphylococcus aureus* y *Escherichia coli* sensibles al enrofloxacin.

PORCINOS: Tiene buena actividad frente a *Mycoplasma hyosynoviae*, *A. pleuropneumoniae*, *S.choleraesuis*, *S.typhimurium*, *S.dysgalactiae* subsp. *Equisimilis*, *S. equi* susp *equi* y *S.equi*. subsp. *Zooepidemicus* aislados de cerdos.

En infecciones producidas por *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *E.coli*, *C. jejuni*

AVES:

Pollos: *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma synoviae*, *Avibacterium paragallinarum*, *Pasteurella multocida*, *Escherichia coli*.

Pavo: *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma synoviae*, *Pasteurella multocida*, *Escherichia coli*.

ESPECIE	Bovinos, ovinos, caprinos, porcinos	Camélidos (alpacas)	Aves
DOSIS	1 mL/40 a 80 kg de p.v.	1 mL/40 kg de p.v.	0.15 mL/2 kg de p.v.
VIA DE ADMINISTRACIÓN	vía intramuscular o subcutánea	vía intramuscular o subcutánea	vía intramuscular
DIAS DE TRATAMIENTO	3 a 4 días consecutivos	3 a 4 días consecutivos	3 a 4 días consecutivos
CANTIDAD DEL PRINCIPIO ACTIVO	2.5 a 5 mg de Enrofloxacin por kg de p.v.	5 mg de Enrofloxacin por kg de p.v.	15 mg de Enrofloxacin por kg de p.v.

ALMACENAMIENTO: Manténgase en un lugar fresco y protegido de la luz solar directa. La temperatura y la humedad son factores negativos para la estabilidad del producto. Almacenar a no menos de 15° y no más de 30°C en promedio. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Usarse solo como se indica.

MARGEN DE SEGURIDAD: Por los Estudios de estabilidad y las Pruebas de Campo se ha comprobado que ENROCU L.A. 20 es un producto seguro y efectivo, no habiéndose observado ningún efecto negativo durante ni después del tratamiento.

PERIODO DE RETIRO:

Carne : 28 días.

No administrar a ponedoras en producción de huevos para consumo humano. No administrar a vacas en producción de leche para consumo humano.

PRECAUCIONES: No administrar por otras vías que no sean las recomendadas. Suprima el uso del medicamento si durante el tratamiento se observa reducción del volumen urinario, alteraciones del sistema eritropoyético o daño en las funciones hepática o renal. Los animales tratados deben contar con suministro de permanente de agua.

La solución debe ser transparente y de aspecto homogéneo; libre de partículas extrañas. No administrar en caso contrario. Una vez abierto el frasco, desechar la porción no utilizada de la solución.

Romper el envase para evitar que lo vuelvan a usar. Eliminar las jeringas descartables usadas. Usarse solo como se indica.

Conserve las indicaciones de asepsia y antisepsia antes y durante la aplicación del producto. Laboratorio CUVITA S.R.L. no se responsabiliza por las consecuencias derivadas del uso (del producto) diferente al indicado en este inserto.

PRESENTACIONES:

Frasco de: 10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL

ENROCU L.A. 20 es una marca registrada de:

Fab. y distribuido por: **Laboratorio CUVITA S.R.L.**
Av. Carlos Izaguirre N° 697, Lima 39 - Perú
Tel.: (51) 999 898 579
Email: Info@laboratoriocuvita.com
Web: laboratoriocuvita.com

Profesional Responsable:

Dra. Susana Terrones Gil - C.M.V. 15102

SENASA: F.082.001.N.01192

