

EQUIGUARD

Antihelméntico oral de amplio espectro para Caballos

Pasta de uso Oral

FÓRMULA:

Cada 100 mL contiene:

Fenbendazol	22.5 g
Ivermectina	0.6 g
Praziquantel	7.5 g
Cianocobalamina	2.0 mg
Excipientes c.s.p.	100 g



DESCRIPCIÓN:

EQUIGUARD, antihelmíntico oral de amplio espectro indicado para: - Tratamiento de infestaciones mixtas de caballo debido a vermes redondos gastrointestinales pulmonares, vermes planos (tenias) y gastrofilos tanto adultos como larvas. - Posee gran poder ovicida y es eficaz contra larvas arrestadas o inhibidas (hipobioticas). - Mayor efectividad contra formas inmaduras y adultas de todo tipo de tenias (cestodes) con efecto escolicida, tenicida y además actúa contra *cisticercos* viables.

AGENTES SUCEPTIBLES:

Nematodos:

Grandes Estrongilos

Strongylus vulgaris (adultos y larvas arteriales).

Strongylus edentatus (adultos estadio larvario L-4)

Strongylus equinus (adultos)

Triodontophorus spp (adultos).

Pequeños Estrongilos:

Cyathostomum: Cylicosilus spp. Cylicostephanus spp.

Cylicodontophorus spp. Gyalocephalus spp (adultos larvas no inhibidas).

Ascaridos: *Parascaris equorum* (adultos y larvas).

Oxiuros: *Oxyuris equi* (larvas).

Tricoststrongilos: *Trichostrongylus axei* (adultos)

Estrongiloides: *Strongyloides esteri* (adultos).

Habronema: *Habronema spp* (adultos)

Onchocerca: *Onchocerca spp* (microfilarias), p.e. oncocercosis cutánea.

Vermes pulmonares: *Dictyocaulus arnfieldi* (adultos y larvas).

Cestodes (tenias equinas): *Anoplocephala perfoliata, Anoplocephala magna, Paranoplocephala mamilliana.*

Insectos dípteros: *Gasterophilus spp* (larvas).

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

Se administra vía oral.

Equinos: 4 g/100 kg de peso vivo (equivale a 900 mg de fenbendazol+ 24 mg de ivermectina+

300 mg de praziquantel + Cianocobalamina (vitamina B12) 0.08 mg / 100 kg de peso vivo).

MODO DE USO DE LA JERINGA

Deslice el anillo hasta la marca que aparece en el émbolo y que indica los gramos para dosificar, una vez colocado en la marca deseada retire el tapón de plástico de la punta de la jeringa, inserte la jeringa en el espacio interdental de la boca y pesione el émbolo hasta topar con el anillo, retire la jeringa y levante la cabeza del animal por unos segundos.

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO:

En infestaciones severas repetir la desparasitación a los 15 a 21 días para romper el ciclo biológico del parásito y/o consultar a su Médico Veterinario para establecer el programa de desparasitación adecuado.

PERIODO DE RETIRO:

Carne: Equinos: 35 días.

CONTRAINDICACIONES:

No usar en equinos en caso de hipersensibilidad a las sustancias activas o a cualquier otra sustancia. No se recomienda el tratamiento de potros menores de 2 meses, al ser poco probable su infestación por cestodos.

No usar el producto en yeguas en proceso de lactación.

REACCIONES ADVERSAS:

Algunos caballos altamente infestados por microfiliarias de *Onchocerca spp* han experimentado, después del tratamiento, reacciones con edema y prurito. Se considera que estas reacciones son el resultado de la destrucción de grandes cantidades de microfiliarias.

En caso de niveles de infestación muy elevados, la destrucción de los parásitos puede provocar ligeros cólicos transitorios y heces blandas en el caballo tratado.

Ocasionalmente se ha informado de reacciones alérgicas como hipersalivación, edema lingual urticaria, taquicardia, congestión de las membranas mucosas y edema subcutáneo, tras el tratamiento con el producto.

MARGEN DE SEGURIDAD:

Por los Estudios de estabilidad y las Pruebas de Campo se ha comprobado que EQUIGUARD es un producto seguro, no habiéndose observado ningún efecto negativo durante ni después del tratamiento. La efectividad de EQUIGUARD ha sido comprobada satisfactoriamente en los resultados obtenidos en estos estudios.

PRECAUCIONES:

Su venta requiere receta Médica. Consulte al Médico Veterinario. Ampliamente seguro de acuerdo a la dosis y al periodo indicado. La empresa farmacéutica, no se responsabiliza por las consecuencias derivadas del mal uso (del producto) diferente al indicado. La solución debe contener precipitado. No administrar en caso contrario. Una vez abierto el envase, desechar la porción no utilizada de la solución.

ALMACENAMIENTO:

Manténgase en un lugar fresco y protegido de la luz solar directa. La temperatura y la humedad son factores negativos para la estabilidad del producto. Almacenar a no menos de 15° y no más de 30°C en promedio. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Usarse solo como se indica.

PRESENTACIONES:

Jeringa dosificadora de 30 g. Frasco PEAD por 250 g, 500 g y 1 k.

EQUIGUARD es una marca registrada de:



Fabricado y distribuido por:

Laboratorio CUVITA S.R.L.

Av. Carlos Izaguirre N° 697, Lima 39 - Perú

Tel.: (51) 999 898 579

Email: Info@laboratoriocuvita.com

Web: laboratoriocuvita.com

Profesional Responsable:

Dra. Susana Terrones Gil - C.M.V. 15102

VENTA BAJO RECETA MÉDICA

SENASA Reg.: