

FEBENMAX 5%

Uso Veterinario

Antiparasitario de amplio espectro

Premezcla (uso en alimento)

FÓRMULA:

Cada 100 gramos contiene:

Fenbendazole..... 5.0 g

Excipientes c.s.p. 100.0 g



INDICACIONES:

FEBENMAX 5%, cual principio activo es el Fenbendazol, es un antiparasitario oral para el control y tratamiento de parasitosis gastrointestinales, pulmonares y renales en aves y porcinos.

Porcinos: Actua contra los huevos y las formas maduras e inmaduras de: *Hyostrongylus rubidus*, *Metastrongylus apri*, *Ascaris suum*, *Trichuris suis*, *Oesophagostomun spp.*, *Stephanurus dentatus*, *Metastrongylus spp.*

Aves: Contra parásitos gastrointestinales y pulmonares como: *Ascaridia galli*, *Heterakis gallinarum*, *Capillaria spp.*

ESPECIES DE DESTINO:

Porcinos y Aves.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

Vía oral mezclada en los alimentos según las indicaciones. La mezcla se realiza de manera diaria. Para mejores resultados el alimento dosificado debe ser consumidos antes de las 24 horas posteriores a la preparación.

Porcinos: En *Ascaris suum*; dosis unica de 0,200 g de FEBENMAX 5% por kg de p.v. (equivalente a 10 mg/kg de Fenbendazol). Para otros nematodos, 1 sobre de 10 g de FEBENMAX 5% por 100 kg de p.v. (equivalente a 500 mg de Fenbendazol).

Aves: 0,200 g – 1 g de FEBENMAX 5% por kg de p.v. (equivalente a 10-50 mg/kg de Fenbendazol) de 3-5 días. También puede administrarse como dosis única de 2 g de FEBENMAX 5% por kg de p.v. (equivalente a 100 mg de Fenbendazol) durante 5 días.

Debe determinarse el peso de los animales con la mayor exactitud posible para evitar una dosificación insuficiente.

La dosis, los días de tratamiento y los intervalos entre dosis se pueden ajustan de acuerdo al criterio del Médico Veterinario tratante. Cualquier factor que afecte el consumo podria modificar los niveles de efectividad del producto.

PERIODO DE RETIRO:

Aves: 4 días

Leche y Carne de Porcino:

No requiere.

PRECAUCIONES:

La solución debe ser transparente y no contener precipitado. No administrar en caso contrario. Una vez abierto el envase, desechar la porción no utilizada de la solución.

Conserve las indicaciones de asepsia y antisepsia antes y dur ante la aplicación del producto. Laboratorio CUVITA S.R.L no se responsabiliza por la mal uso del producto y las consecuencias posteriores a la dosificación.

CONTRAINDICACIONES:

No debe administrarse fenbendazol a cerdas preñadas durante los primeros 3 meses de la gestación.

No debe administrarse fenbendazol a las aves durante la muda.

Pueden darse reacciones alérgicas causadas por la muerte de parásitos y la consiguiente liberación masiva de alérgenos. Se ha observado sobre todo tras el tratamiento contra *larva migrans* de *Strongylus vulgaris*.

La administración simultánea de fenbendazol con derivados del **bromsalam** (fasciolicidas del grupo de las salicilanilidas, hoy mayormente en desuso) puede provocar intoxicaciones agudas en bovinos y ovinos.

ALMACENAMIENTO:

Manténganse en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar directa. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. La temperatura y la humedad son factores negativos para la estabilidad del producto. Almacenar a no menos de 15°C y no más de 25°C en promedio. Usarse como se indica. Laboratorio CUVITA S.R.L. no se responsabiliza por el mal almacenamiento del producto.

PRESENTACIONES:

Caja dispensadora de 50 sobres de 10 gramos, Sobre por 50 gramos, Sobre por 100 gramos
Sobre por 500 gramos, Sobre por 1 kilogramo, Bolsa por 5 kilogramos.

FEBENMAX 5% es una marca registrada de:



Fabricado y distribuido por:

Laboratorio CUVITA S.R.L.

Av. Carlos Izaguirre N° 697, Lima 39 - Perú

Tel.: (51) 999 898 579

Email: Info@laboratoriocuvita.com

Web: laboratoriocuvita.com

Profesional Responsable:

Dra. Susana Terrones Gil - C.M.V. 15102

Reg. SENASA: F.08.70.N.1162

VENTA BAJO RECETA MEDICA