

FENTRIMEC COMPLEX

Fasciolicida, nematocida y tenicida con efecto energizante

Suspensión Oral

FÓRMULA:

Cada 100mL contiene:

Triclabendazole	12.0 g
Fenbendazol	10.0 g
Praziquantel	5.0 g
Selenio	20.0 mg
Sulfato de Cobalto	100.0 mg
Cobre	50 mg
Excipientes c.s.p.	100.0 ml



INDICACIONES:

Antiparasitario oral, de amplio espectro y gran eficacia contra las formas juveniles y adultas de Fasciola Hepática y contra nemátodos gastrointestinales, pulmonares y tenias en ganado bovino, ovino, caprino y camélidos sudamericanos. La asociación con minerales ayudan a prevenir la anemia, mejora el pelaje, la lana y la piel. También mejora el nivel reproductivo, incrementan la ganancia de peso corporal y conversión alimenticia, y disminuye la excreción de nitrógeno urinario. *Fasciola hepática* (estadio inmaduro temprano, inmaduro y adulto). Parásitos gastrointestinales: *Haemonchus sp.*, *Ostertagia ostertagi*, *Ostertagia lyrata*, *Trichostrongylus sp.*, *Cooperia oncophora*, *Cooperia punctata*, *Cooperia pectinata*, *Oesophagostomum radiatum*, *Strongyloides papillosus*, *Nematodirus helvetianus*, *Nematodirus spathiger*, *Toxocara vitulorum* y *Trichuris spp.* Parásitos pulmonares: *Dictiocaulus viviparus*, *Dictiocaulus filaria*. Ectoparásitos: *Sarcoptes sp.*, *Haematopinus sp.*, *Dermatobia hominis*, *Boophilus microplus*, *Cochliomyia hominivorax*, *Linognathus vituli*, *Psoroptes spp.* También está indicado como auxiliar en el control de la población de la mosca de los cuernos (*Haematobia irritans*).

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

Se administra por vía oral.

BOVINOS: 1 ml por cada 10 kg de peso vivo (equivalente a: Triclabendazol: 120 mg, Fenbendazol: 100 mg, Praziquantel: 50 mg, Selenio: 0.2 mg, Cobalto: 1 mg, Cobre: 0.5 mg por 10 kg de p.v.).
OVINOS, CAPRINOS, CAMELIDOS SUDAMERICANOS: 1 ml por cada 12 kg de peso vivo (equivalente a Triclabendazol: 120 mg, Fenbendazol: 100 mg, Praziquantel: 50 mg, Selenio: 0.2 mg, Cobalto: 1 mg, Cobre: 0.5 mg por 12 kg de p.v.)

INTERVALO ENTRE DOSIS: Única dosis. Dosificar antes y después de las lluvias. En centros de engorde dosificar antes del inicio del ciclo de engorde.

ESPECIES DE DESTINO:

Bovinos, caprinos, ovinos y camélidos sudamericanos.

PERIODO DE RETIRO:

Carne: 45 días.

No administrar en hembras en período de lactación. No utilizar en ganado lechero en producción. No utilizar 28 días antes del parto.

DURACIÓN DE TRATAMIENTO:

Única dosis y evaluar la respuesta al tratamiento. La dosis, los días de tratamiento y los intervalos entre dosis se ajustan de acuerdo al criterio del Médico Veterinario tratante y al grado de infestación.

Uso Veterinario

PRECAUCIONES:

No administrar a pacientes con hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. Administrar el producto solo por la vía de administración indicada. No se recomienda su uso en otras especies que no sean las autorizadas.

No es tóxico y es bien tolerado, su dosis puede aumentarse o disminuirse a criterio del Médico Veterinario. Se recomienda administrar el producto antes de la ingesta de las pasturas. La empresa no se responsabiliza por las consecuencias derivadas del uso (del producto) diferente al indicado.

ALMACENAMIENTO:

Manténgase en un lugar fresco y seco. La temperatura y la humedad son factores negativos para la estabilidad del producto. Almacenar a no menos de 15° y no más de 30°C en promedio. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Usarse solo como se indica.

MARGEN DE SEGURIDAD:

Altamente seguro, si se administra en la dosis recomendada. Las combinaciones de los tres (03) principios activos presentan un amplio efecto aditivo, gran seguridad en su uso y poca posibilidad de generación de resistencia. Tiene un margen de seguridad hasta diez (10) veces la dosis recomendada.

CONTRAINDICACIONES:

- No se ha reportado contraindicaciones ni limitaciones en la dosis recomendada.
- El producto es muy bien tolerado por su baja toxicidad en mamíferos.
- No administrar conjuntamente con los derivados bromados de la salicilamidilida.
- No se recomienda en animales debilitados ni en situaciones de stress intenso.
- No utilizar en vacas lecheras en producción para consumo humano.

PRESENTACIONES:

Frasco de: 250 mL, 500 mL, 1 lt.



Av. Carlos Izaguirre N°697, Lima 39 - Perú
Central Telefónica: (51) 999 898 579
Email: ventas@laboratoriocuvita.com

Profesional Responsable:

Dra. Susana Terrones Gil - C.M.V. 15102

Reg.SENASA PERU: F.008.002.N.01348

Venta bajo receta médica veterinaria.