

# IVERMEXIN PREMIUM

Antiparasitario interno y externo / Anabolico

Uso Veterinario

## FÓRMULA: Cada ml contiene:

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Ivermectina .....            | 40.0 mg |
| Boldenona undecilenato ..... | 20.0 mg |
| Excipientes c.s.p. ....      | 1.0 ml  |



## INDICACIONES DE USO:

IVERMEXIN PREMIUM, antiparasitario de gama alta, eficaz contra parásitos internos y externos (pulmonares y gastrointestinales). **La Boldenona** presente en el producto ayuda a la asimilación del nitrógeno, convirtiéndolo en proteína logrando el aumento de la masa muscular y peso corporal, especialmente en animales débiles o convalecientes de enfermedades. También como adyuvante en animales que se encuentran débiles, coadyuvante en cuadros de raquitismo y osteomalacia, y apoyando la estimulación de la eritropoyesis de la anemia.

Parásitos gastrointestinales: *Haemonchus* sp., *Ostertagia ostertagi*, *Ostertagia lyrata*, *Trichostrongylus* sp., *Cooperia oncophora*, *Cooperia punctata*, *Cooperia pectinata*, *Oesophagostomum radiatum*, *Strongyloides papillosus*, *Nematodirus helvetianus*, *Nematodirus spathiger*, *Toxocara vitulorum* y *Trichuris* spp.

Parásitos pulmonares: *Dictiocaulus viviparus*, *Dictiocaulus filaria*.

Ectoparásitos: *Sarcoptes* sp., *Haematopinus* sp., *Dermatobia hominis*, *Boophilus microplus*, *Cochliomyia hominivorax*, *Linognathus vituli*, *Psoroptes* spp. También está indicado como auxiliar en el control de la población de la mosca de los cuernos (*Haematobia irritans*).

## ESPECIES DE DESTINO:

Bovinos.

## MARGEN DE SEGURIDAD:

Por los Estudios de estabilidad y las Pruebas de Campo se ha comprobado que IVERMEXIN PREMIUM es un producto seguro, no habiéndose observado ningún efecto negativo durante ni después del tratamiento. La efectividad de IVERMEXIN PREMIUM ha sido comprobada satisfactoriamente en los resultados obtenidos en estos estudios.

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

Se administra por vía intramuscular

Bovinos: 1 mL de IVERMEXIN PREMIUM por 50 kg de p.v. (equivalente a 40.0 mg de Ivermectina, 20.0 mg de Boldenona)

Repetir la dosis cada 90 a 120 días si es necesario.

La dosis, los días de tratamiento y los intervalos entre dosis se ajustan de acuerdo al criterio del Médico Veterinario tratante.

## PERIODO DE RETIRO:

49 días.

Los animales no deben ser sacrificados hasta 30 días después de finalizado el tratamiento. No administrar en vacas en producción de leche.

## SEGURIDAD:

IVERMEXIN PREMIUM puede ser aplicado en cualquier etapa del proceso de gestación debido a que no afecta la fertilidad ni fetos durante su formación; tampoco afecta el desempeño reproductivo en sementales.

**REACCIONES ADVERSAS:**

Cuando se usa para el tratamiento de la larva de *Hypoderma bovis* (cresa del bovino) en el ganado, la ivermectina puede inducir importantes efectos adversos al matar a las larvas cuando éstas se encuentran en áreas vitales. Las larvas muertas presentes en el canal vertebral pueden causar parálisis y tambaleo. Las larvas muertas en el esófago pueden inducir salivación y timpanismo. Estos efectos pueden ser evitados tratando las cresas inmediatamente después de la estación de la mosca o durante el estadio de desarrollo de la cresa cuando se encuentra en las áreas mencionadas. En bovinos puede experimentar molestia o tumefacción transitoria en el sitio de inyección. Usando un máximo de 10 ml en cualquier sitio de inyección, se puede ayudar a minimizar estos efectos. La boldenona puede causar retención de nitrógeno, sodio, potasio y fósforo y reducir la excreción urinaria de calcio.

**TOXICIDAD:**

Administrado a las dosis indicadas no produce efectos tóxicos. Los envases o cualquier residuo del producto, deben eliminarse de forma segura ya que la Ivermectina afecta de forma adversa a los peces y otros organismos acuáticos.

**PRECAUCIONES:**

Una vez abierto el frasco, desechar la porción no utilizada de la solución. El contenido de cada envase es para un solo uso. Romper el envase para evitar que este se vuelva a usar. Eliminar las jeringas descartables usadas. Usarse solo como se indica. Conserve las indicaciones de asepsia y antisepsia antes y durante la aplicación del producto. Laboratorio CUVITA S.R.L. no se responsabiliza por las consecuencias derivadas del uso (del producto) diferente al indicado en este inserto.

**ALMACENAMIENTO:**

Manténgase en un lugar fresco y protegido de la luz solar directa. La temperatura y la humedad son factores negativos para la estabilidad del producto. Almacenar a no menos de 15° y no más de 30°C en promedio. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Usarse solo como se indica.

**PRESENTACIONES:**

Frasco de: 10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL



Elaborado y Distribuido por:

**LABORATORIO CUVITA S.R.L.**

Av. Carlos Izaguirre N°697 Lima 39 - Perú

Tel.: (51) 999 898 579

Email: [ventas@laboratoriocuvita.com](mailto:ventas@laboratoriocuvita.com)

**Profesional Responsable:**

Dra. Susana Terrones Gil - C.M.V. 15102